

UDS

Mi Universidad

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Lic. Cecilia


NOMBRE DEL ALUMNO (A): *Laura Isabel De La Cruz Montes*

NOMBRE DEL TRABAJO: *Tríptico de la hepatitis y clasificación*


NOMBRE DE LA MATERIA: patología del niño

HEPATITIS

Es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud y puede ser mortal.



Las cinco cepas principales del virus de la hepatitis son las de los tipos **A, B, C, D, y E**.



Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
Leve Se Transmite	Crónica Se Transmite	Más grave Se Transmite	Muy grave Se Transmite
<ul style="list-style-type: none"> Agua o alimentos contaminados Uso de aseo 	<ul style="list-style-type: none"> Contacto con sangre, semen y fluidos corporales infectados Perforación, tatuajes, piercings, cicatrías, tatuajes, piercings Compartir agujas 	<ul style="list-style-type: none"> Contacto con sangre infectada Contacto con sangre infectada Contacto con sangre infectada Contacto con sangre infectada 	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite solo a través de la sangre infectada Contacto con sangre infectada Contacto con sangre infectada Contacto con sangre infectada
Vacunación	Vacunación	Vacunación	Vacunación
Síntomas	Síntomas	Síntomas	Síntomas
<ul style="list-style-type: none"> Para ser detectado, se necesitan análisis Se detecta en el hígado de forma permanente 	<ul style="list-style-type: none"> Encefalopatía con o sin ictericia Encefalopatía con o sin ictericia Encefalopatía con o sin ictericia 	<ul style="list-style-type: none"> Encefalopatía con o sin ictericia Encefalopatía con o sin ictericia Encefalopatía con o sin ictericia 	<ul style="list-style-type: none"> Encefalopatía con o sin ictericia Encefalopatía con o sin ictericia Encefalopatía con o sin ictericia




Infección hepática muy contagiosa ocasionada por el virus de la hepatitis A.



La *hepatitis A* se puede prevenir con una vacuna. Se propaga mediante el agua o los alimentos contaminados, o por el contacto con una persona infectada.

SÍNTOMAS

- Áreas de dolor: abdomen, articulaciones o músculos
- Gastrointestinales: diarrea, náusea o vómitos
- Todo el cuerpo: fatiga, fiebre o pérdida de apetito



Tratamiento

- Cuidado paliativos: Puede sanar solo o Rehidratación.
- Cuidado personal: Evitar el consumo de alcohol y Descanso.

Las medidas de prevención van a depender del tipo de virus:

- TIPO A:** Lavado frecuente de manos, Lavado de frutas y verduras, Vacuna para prevenir la Hepatitis A



CÓMO SE CONTAGIA

A través del agua o de alimentos contaminados

Infección grave del hígado causada por el virus de la hepatitis B que se puede prevenir fácilmente mediante una vacuna.




Generalmente, esta enfermedad se transmite por la exposición a los fluidos corporales infectados.

SÍNTOMAS

Los síntomas varían y pueden incluir:

- color amarillento de los ojos,
- dolor abdominal
- orina oscura.

Tratamiento

- Medicamento: antivirales, el **entecavir (Baraclude)**, el **tenofivir (Viread)**, la **lamivudina (Epivir)**, el **adefovir (Hepsera)** o la **telbivudina**,
- Cuidado personal: Evitar el consumo de alcohol y Descanso.

CÓMO SE CONTAGIA

Por elementos en contacto con sangre (agujas sucias o sangre sin analizar), Por relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección


Hepatitis C

Infección causada por un virus que ataca al hígado y provoca inflamación.

El virus se propaga por el contacto con la sangre contaminada, por ejemplo, al compartir agujas o utilizar equipos de tatuaje no esterilizados.



SÍNTOMAS Hepatitis "C"






Tratamiento

Se trata con medicamentos antivirales. En algunas personas, los fármacos más recientes pueden erradicar el virus..

- Medicamento antiviral
- Evitar el alcohol
- Y en cirugía un trasplante de hígado.



Tratamiento
Hay pocos tratamientos específicos para la hepatitis D, aunque se deben intentar diferentes regímenes. El tratamiento también se enfoca en los cuidados de apoyo.



- Tratamiento personas: evitar el consumo de alcohol.

CÓMO SE CONTAGIA

Por elementos en contacto con sangre (agujas sucias o sangre sin analizar), De madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.



El virus de la hepatitis E se transmite principalmente al consumir agua infectada con materia fecal



Síntomas:

- Ictericia
- Áreas de dolor: abdomen o articulaciones
- Gastrointestinales: heces pálidas, náusea o vómitos
- Todo el cuerpo: fatiga, fiebre o pérdida de apetito
- También comunes: orina oscura o piel y ojos amarillos




Tratamiento

Generalmente, se cura sin necesidad de tratamiento al cabo de cuatro a seis semanas, consiste en :

- cuidados de apoyo
- Rehidratación
- reposo.

CÓMO SE CONTAGIA

A través del agua o de alimentos contaminados.




Hepatitis alcohólica:
Inflamación del hígado ocasionada por la ingesta excesiva de alcohol. La hepatitis alcohólica puede presentarse por el consumo excesivo de alcohol durante muchos años



Síntomas:

- Hidratación
- cuidado nutricional
- dejar de tomar alcohol.
- Los fármacos esteroides pueden reducir la inflamación del hígado.



Tratamiento

hidratación, cuidado nutricional y dejar de tomar alcohol. Los fármacos esteroides pueden reducir la inflamación del hígado.



https://www.who.int/es/health-topics/hepatitis#tab=tab_1

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000279.htm>

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-e>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/alcoholic-hepatitis/symptoms-causes/syc-20351388>