



Nombre del Alumno

MARGARITA DEL CARMEN GOMEZ MORALES

Nombre del tema

PARASITOS INTESTINALES EN NIÑOS

Parcial

2

Nombre de la Materia

PATOLOGIA DEL NIÑO Y ADOLECENTE

Nombre del profesor

CECILIA DE LA CRUZ

Nombre de la Licenciatura

LIC. EN ENFERMERIA

Cuatrimestre

5

PARASITOS INTESTINALES EN NIÑOS



Los parásitos intestinales son conocidos de una manera coloquial como lombrices y suelen padecerlos habitualmente en los niños pequeños

La parasitosis es una infección del tubo digestivo, que pueden producirse por ingerir huevos o larvas de gusanos, o por la penetración transcutánea desde el suelo.

Podemos hablar de dos grandes tipos:

Protozoos: giardiasis, amebiasis, criptosporidiasis, blastocystis hominis.
Helmintos (gusanos cilíndricos o planos): nemátodos (en este grupo se encontrarían los oxiuriasis y el anisakis, entre otros), tremátodos, cestodos.

Se aloja en el intestino de las personas y se elimina a través de las heces.

Tratamiento

- Metronidazol
- Tinidazol
- Nitazoxanidazol

La giardiasis es un parásito muy pequeño, siendo el causante de la mayoría de las infecciones por parásitos en todo el mundo.

Entre los síntomas hay que señalar fuertes dolores abdominales, vómitos, náuseas y gases. En alguno de los casos dicho parásito puede llegar a provocar que la persona pierda un peso excesivo.



Prevención

Lavarse las manos después de ir al baño o de cambiar pañales y antes de comer o preparar alimentos.

Evitar beber agua no tratada de pozos poco profundos, lagos, ríos, manantiales, estanques y arroyos, a menos que este filtrada o hervida.

No tragar agua en piscinas o lagos.

Si viajas bebe agua embotellada.

PARASITOS INTESTINALES EN NIÑOS

La oxiuriasis

Es otro parasito bastante habitual entre los niños. Suele localizarse en ambos intestinos, migrando hacia el ano para depositar huevos.

Opciones de tratamiento

Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos y cuidados personales para protegerse de la infección.

El síntoma principal es el picor anal y perineal, generalmente nocturno. Esto se debe a la secreción pegajosa que dejan los huevos para adherirse a la piel. El picor intenso produce molestias en el niño, llanto, irritabilidad, pesadillas, e incluso sonambulismo.

Tomar precauciones sencillas, como tener buenos hábitos de higiene, cortarles las uñas a los niños, evitar comerse las uñas, además de hervir la ropa de las personas infectadas para impedir que los huevos de los parásitos contaminen a otras personas, ya que estos pueden permanecer hasta 3 semanas en el ambiente pudiendo infectar a alguien.

Ascariosis

Se trata de un gusano cilíndrico perteneciente a la familia de los nematodos que puede llegar a medir hasta 40 cm, siendo uno de los parásitos más frecuentes en el mundo

Tratamiento

Los medicamentos antiparasitarios son la primera línea de tratamiento contra la ascariosis. Los más comunes son:

Albendazol (albenza)

Ivermectina (stromectol)

Mebendazol

El contagio se produce al ingerir los huevos a través de tierra infectada, alimentos y aguas contaminadas.

El ciclo de vida dentro del cuerpo humano es complejo, pero pueden llegar a vivir dos años.

Prevención

Lavarse las manos antes de manipular los alimentos.

Lavar, pelar y cocinar verduras antes de comer

El tratamiento comunitario masivo


PARASITOS INTESTINALES EN NIÑOS

Blastocystis hominis

Un parásito que se encuentra en las heces.

Los síntomas van a variar según el tipo de parásito llegando a provocar serios problemas en el estómago tales como dolores abdominales o vómitos.

La falta de apetito y el picor en el ano son otros síntomas bastante habituales de este tipo de parásito intestinal.




El contagio va a depender en gran medida del tipo de parásito intestinal que tenga la persona. Lo más normal es que el contagio se produzca por vía oral-fecal. Ello se va a producir cuando hay una falta de higiene en las **manos** sobre todo cuando van al servicio o cuando cambian el pañal de un bebé. Al no limpiarse bien las manos, se contamina todo lo que se manipula con las mismas.

Si tienes una infección por Blastocystis sin signos ni síntomas, no necesitas tratamiento. Los signos y síntomas leves pueden mejorar en forma natural después de unos pocos días.

Los medicamentos posibles para eliminar una infección por Blastocystis y mejorar los síntomas incluyen:

- Antibióticos, como metronidazol (Flagyl) o tinidazol (Tindamax)
- Medicamentos combinados, como sulfametoxazol y trimetoprima (Bactrim, Septra, otros)
- Medicamentos antiprotozoos, como paromomicina o



Bibliografía

[Los parásitos intestinales en los niños - Bekia Padres](#)

[Blastocystis hominis - Diagnóstico y tratamiento - Mayo Clinic](#)

[▷ Tratamiento de la Giardiasis - Tratamiento](#)

[Oxiuriasis: Qué es, síntomas, prevención y tratamiento - Tua Saúde \(tuasaude.com\)](#)