

# **TIPOS DE PARASITOS INTESTINALES EN NIÑOS**

**ALUMNA:GRACIELA DEL CARMEN LOPEZ HERNANDEZ**

**MATERIA:Patología del Niño y Adolescente**

**Maestra:Cecilia de la Cruz Sanchez**

**CUATRIMESTRE:"5"**

**GRUPO:"B"**




Dos de los parásitos intestinales más frecuentes son Giardia y Oxiurus. Otros parásitos suelen afectar a niños nacidos fuera de Canadá o que han vivido en países en desarrollo donde las condiciones sanitarias e higiénicas son deficientes. Éstos incluyen Ascaris, amebas y tenias.

Al comer alimentos expuestos a las moscas, ya que éstas trasladan heces fecales en sus patas y las depositan sobre los alimentos. Cuando caminamos descalzos, pues la tierra se encuentra contaminada con heces fecales y los parásitos se introducen a través de los poros de las plantas de los pies.

En el caso de los niños que se enferman, los síntomas pueden incluir:

- diarrea acuosa.
- heces blandas y de apariencia aceitosa.
- cansancio.
- retorcijones estomacales.
- hinchazón.
- náuseas.
- notable pérdida de peso.



La presencia de estos gusanos en el organismo produce disminución del apetito, bajo peso, apatía, irritabilidad, bajo rendimiento escolar (en niños), dolor de barriga, diarrea, falta de sueño y rechinar de los dientes, entre otros

### **Cómo prevenir el contagio**

\*Lavarse las manos principalmente después de ir al baño y antes de comer .

\*No comer carne ni verduras crudas o frutas sin lavar.

\*Hervir el agua para beber por lo menos un minuto, en especial si la tomarán lactantes y niños.

\*Intentar no tragar agua al nadar en piletas.



## TIPOS DE PARASITOS INTESTINALES EN NIÑOS

