



Mi Universidad

MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: Blandí Jorgelina Lopez García.

TEMA: (Tipos de maduración.)

PARCIAL: 1°.

MATERIA: Cuidados del niño y el adolescente.

NOMBRE DEL PROFESOR: Mtra. Romelia De León Méndez.

LICENCIATURA: Enfermería.

CUATRIMESTRE: 5°

Frontera Comalapa Chiapas a 21 de enero del año 2023.

TIPOS DE MADURACION

MADURACIÓN DENTARIA.

La manera más sencilla de seguir el desarrollo dentario.

Es

Contar el número y tipo de piezas que han brotado.

LA DENTICIÓN DECIDUAL, TRANSITORIA O DE "LECHE"

Hace su erupción por lo general entre los 6 meses y los 2 años y medio de edad.

Siendo utilizada

como índice de madurez biológica del niño

Bajo el siguiente orden

MADURACIÓN PSICOMOTRIZ

LACTANTE 1ER TRIMESTRE

La conducta del lactante del primer trimestre está regida por reflejos arcaicos.

Características

Actitudes posturales. En decúbito dorsal.

Tienden a

obedecer a los cambios tónicos asimétricos de los músculos del cuello y a los impulsos flexores y abductores de los que el lactante pequeño está dotado.

MADURACIÓN ÓSEA

Es una estimación de la maduración de los huesos de un niño.

A medida que

una persona crece desde la vida fetal hasta la adulta, los huesos del esqueleto cambian de forma y tamaño.

La edad ósea

" de un niño es la edad media en la que los niños alcanza esta madurez ósea.

MADURACIÓN SEXUAL

Los niños y niñas alcanzan la altura y la maduración. De los 10 a 20 años

El ritmo y la velocidad

De estos cambios varían en cada persona y están determinados por factores hereditarios y ambientales.

CAMBIOS FISICOS

El estirón de crecimiento en los niños se da a la mitad de la adolescencia, entre las edades de 12 y 17 años, un año después de que los testículos comiencen a aumentar de tamaño.

Incisivos centrales inferiores a los 6 meses y los superiores a los 7½ meses. Incisivos laterales inferiores a los 7 meses y los superiores a los 9.

Los caninos

Inferiores brotan a los 16 meses y los superiores a los 18; el primer molar inferior, a los 12 y el superior a los 14 meses.

Segundo premolar

inferior brota a los 20 y el superior a los 24.

LA DENTICIÓN PERMANENTE O SEGUNDA DENTICIÓN

verificada entre los 6 y los 13 años. De los 2 a los 6 años y de los 13 en adelante.

Incisivos centrales

inferiores brotan entre los 6 y 7 años y los superiores, entre los 7 y 8 años

Caninos inferiores

edad de 9 a 10 años y los superiores entre los 11 y 12

La posición aritmética de la cabeza

Produce asimetría postural de los miembros, predominando la extensión en los del hemicuerpo hacia el que parece mirar el niño.

A finales del tercer mes

Se observan intentos de control cefálico durante la maniobra; sin embargo, su ejercitación acelera el aprendizaje,

El lactante del segundo trimestre

Tiene una personalidad peculiar: suele mostrarse especialmente durante el tercero y el cuarto mes sereno y apacible,

La edad ósea y la altura de un niño pueden ser usadas para predecir la edad de adulto.

Aquellos con

Unas edades óseas avanzadas generalmente experimentan un rápido crecimiento o "estirón".

Mientras

Aquellos con una edad ósea atrasada crecen con menor velocidad.

Los niños

Creced unos 10 cm durante el año de crecimiento máximo.

El crecimiento de las niñas

se produce al principio de la adolescencia, entre los 9 años y medio y los 14 años y medio y crecen cerca de 9 cm en el año de máximo crecimiento.

MADURACION SEXUAL

Comienza a diferentes edades dependiendo de factores genéticos y ambientales.

Debido a

La nutrición, la salud general y las condiciones de vida.

LOS CAMBIOS EN NIÑOS

Empiezan con el aumento de tamaño del escroto y los testículos, seguido del agrandamiento del pene.

Vello pubiano, vello axilar, y vello facial 2 años después del pubiano

bicúspide

Primera: inferior entre los 10 y 12 años y superior a los 10 o 11 segunda: a 11 o 12 años y la superior entre los 10 y 12 años

molares

Primer: tanto los superiores como los inferiores, surgen de los 6 a 7 años. segundos 11 y 13 años. Terceros: 17 a 21 años.

O sea, la dentición definitiva tiene 32 piezas, a diferencia de la decidua, que es de 20.

Es en este trimestre

La edad de las grandes sonrisas indiscriminadas, de las miradas que saltan como de asombro en asombro, del interés preferente por el rostro humano.

Los reflejos musculares profundos

Habitualmente denominados osteotendinosos, son fáciles de lograr en este período y no ofrecen variantes mencionables

Comienza

La clarificación de las relaciones entre el yo y el medio, y, al adquirir el niño nebulosa conciencia de sí mismo, empieza también a percatarse de que hay un mundo que lo rodea.

La movilización pasiva

Es más fácil: cuesta poco extender o flexionar los miembros, y el balanceo es amplio, salvo a nivel de cabeza cuello, donde se observa alguna firmeza.

Tienen su primera

Eyacuación entre los 12 años y medio y los 14 años de edad, alrededor de 1 año después de que se acelere el crecimiento del pene.

LOS CAMBIOS EN NIÑAS

El crecimiento incipiente de las mamas es el primer signo de maduración sexual seguido de cerca por el inicio del estirón de crecimiento.

después

Aparece vello púbico y axilar. La menstruación comienza típicamente alrededor de 2 años después del comienzo del desarrollo del pecho.