



**Mi Universidad**

**NOMBRE DEL ALUMNO: Fatima Guadalupe Díaz Camposeco.**

**TEMA: Placenta acreta y `placenta previa.**

**PARCIAL: 4to parcial.**

**MATERIA: Ginecología y obstetricia.**

**NOMBRE DEL PROFESOR: Lic. Ervin Silvestre Castillo.**

**LICENCIATURA: Enfermería.**



**CUATRIMESTRE: 5to cuatrimestre.**

# Acretismo placentario.

## ¿Qué es?

es la inserción anormal de parte o de toda la placenta, con ausencia total o parcial de la decidua basal y anomalía de la caduca verdadera con penetración de las vellosidades coréales al miometrio.

## Tipos.




## Etiología.

- ❖ Cirugía Uterina Previa
- ❖ Edad materna > 35
- ❖ Multiparidad.
- ❖ Miomas submucosos
- ❖ Cirugía uterina previa, incluso la miomectomía
- ❖ Lesiones endometriales como el síndrome de Asherman


## Diagnostico.

- Ecografías.
- Estudios de RM y flujo doppler.
- Durante el embarazo:
  - La placenta no ha sido expulsada a los 30 minutos de la salida del bebé.
  - Los intentos de extracción manual no pueden crear un plano de separación.
  - La tracción de la placenta causa hemorragia de gran volumen.




## Tratamiento.

Cesárea programada con histerectomía.



# Placenta previa.



## ¿Qué es?

La placenta previa es un trastorno que se produce durante el embarazo en el que la placenta cubre total o parcialmente la abertura del útero

## Tipos.



Placenta de inserción baja



Placenta marginal



Placenta previa parcial



Placenta previa total

## Factores de riesgo.



Hipertensión arterial



Miomas uterinos



Desprendimiento de placenta previo



Hemorragia



Contracciones uterinas



Dolor abdominal



Infección uterina



Edad materna



Tabaquismo



Bajada de la presión arterial



Dolor de espalda

## Diagnostico.



## Tratamiento.



Reposo



Transfusiones de sangre



Cesárea

- Más ecografías para hacer un seguimiento de dónde está la placenta.
- Descanso en cama u hospitalización.
- Parto anticipado. Esto dependerá de cuánto sangrado tenga usted, de qué tan avanzado esté el embarazo y de qué tan saludable esté su bebé.
- Parto por cesárea.
- Transfusión de sangre para tratar una pérdida de sangre importante.