



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: Rosalba Mazariegos López

TEMA: cesárea

PARCIAL: 3°

MATERIA: ginecología y obstetricia

NOMBRE DEL PROFESOR: Ervin Silvestre Castillo

LICENCIATURA: enfermería


CUATRIMESTRE: 5°

CESAREA

Es



La intervención quirúrgica que tiene como objetivo extraer el producto de la concepción y sus anexos ovulares a través de una laparotomía e incisión de la pared uterina.



Tipos

Grado de urgencia

Categoría 3

Según antecedentes obstétricos

Es la que se practica para resolver o prevenir una complicación materna o fetal en etapa crítica.

Presentación pélvica con pródomos, prueba de trabajo de parto negativo, cesárea previa por desproporción cefalopélvica.

Primera

Es la que se realiza por primera vez

Categoría 1

Placenta previa central total, parcial, marginal o inserción baja con hemorragia obstétrica, bradicardia fetal, desaceleraciones tardías, periodo expulsivo prolongado, placenta previa sangrante.

Categoría 4

Situación transversa con trabajo de parto, antecedentes de cirugía uterina, cardiopatía clases III y IV, compensada con trabajo de parto, con lesiones externas que generen distocia

Iterativa

Es la que se realiza en una paciente con antecedentes de dos o más cesáreas.

Categoría 2

Taquicardia fetal persistente, compromiso de histerorrafia, iterativa en trabajo de parto, presentación pélvica en trabajo de parto con más cuatro cm, situación anómala con trabajo de parto,


Electiva

Es la que se realiza en ausencia de alguna indicación médica u obstétrica y a conveniencia de la paciente, el médico o ambos

Repetida o previa

Es cuando existe el antecedente de una cesaría anterior

CESAREA



INDICACIONES DE LA OPERACIÓN CESAREA

La indicación para realizar una operación cesárea puede ser por causas maternas, fetales o mixtas.

Causas maternas

Distocia de partes Oseas

Como son

- ❖ Estrechez pélvica
- ❖ Pelvis asimétrica
- ❖ Tumores óseos de pelvis

Causas fetales

Sufrimiento fetal

Macrostomia fetal que condiciona desproporción cefalopélvica

Restricción en el crecimiento intrauterino

Oligohidramnios severo

Cesárea pos_mortem

Causas mixtas

Síndrome de desproporción cefalopélvica

Preeclampsia severa/eclampsia

Embarazos múltiples

Mujeres con infección por el VIH/SIDA

Infección Intramniótica

CESAREA

