



Mi Universidad

Mapa conceptual.

NOMBRE DEL ALUMNO: Fatima Gpe. Díaz Camposeco.

TEMA: Cesárea.

PARCIAL: 3ro.

MATERIA: Ginecología y obstetricia.

NOMBRE DEL PROFESOR: Lic. Ervin Silvestre Castillo.

LICENCIATURA: Enfermería.

CUATRIMESTRE: 5to.

Cesárea.

¿Qué es?

Es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción del feto por vía abdominal a través de una incisión en el útero.

Tipos de cesárea.

Divididos en categorías.

Según antecedentes obstétricos.

Los cuales son.

Primera.

Es la que se realiza por primera vez.

Iterativa.

La que se practica en una paciente con antecedentes de dos o más cesáreas.

Repetida.

Es cuando existe el antecedente de una cesárea anterior.

Grado de urgencia.

Categoría 1.

Amenaza inmediata para la vida de la mujer o el feto.

Categoría 2.

Interrupción mediata para la vida materna o fetal.

Categoría 3.

No hay compromiso materno o fetal pero se requiere interrumpir el embarazo.

Categoría 4.

Requiere nacimiento temprano.

Tipos de histerotomía.

Corporal o clásica.

Segmento corporal (Tipo Beck).

Segmento arciforme (Tipo Kerr)

Transversa por avulsión (MisgavLadach).

Indicaciones de la cesárea.

Factores influyentes.

Causas maternas.

Dividida en dos.

Distocia de partes óseas.

- Estrechez pélvica.
- Pelvis asimétrica o deformada.
- Tumores óseos de la pelvis

Distocia de partes blandas.

- Malformaciones congénitas
- Tumores del cuerpo o segmento uterino, cérvix, vagina y vulva.
- Cirugía previa del segmento y/o cuerpo uterino, dos o más cesáreas previas.
- Cirugía previa del cérvix, vagina y vulva.
- Distocia de la contracción.
- Hemorragia vaginal.

Causas fetales

- ✓ Sufrimiento fetal.
- ✓ Macrosomía fetal.
- ✓ Restricción en el crecimiento intrauterino.
- ✓ Oligohidramnios severo.
- ✓ Alteraciones de la situación, presentación o actitud fetal.
- ✓ Prolapso de cordón umbilical o alguna extremidad del feto.
- ✓ Malformaciones fetales.
- ✓ Embarazo prolongado con contraindicación para parto vaginal.
- ✓ Cesárea post mórtem

Causas mixtas.

Síndrome de desproporción cefalopélvica.
Preclamsia severa/eclampsia.
Embarazos múltiples.
Infección Intramniótica.
Isoinmunización materno-fetal.
Mujeres con infección por el VIH/SIDA