



UDS

ejecución

nombre del alumno:

José aidan espinosa Juárez

Nombre del profe:

María del Carmen López

Nombre de la carrera

Enfermería II


Nombre de la materia

Fundamentos en enfermería

Nombre del tema

Ejecución en enfermería

ADM^o N:stfacion de Medicamentos.



~~ADM^o N:stfacion de Medicamentos~~

Preparación de la solución para el cultivo de la bacteria

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo

Preparación de la solución para el cultivo de la bacteria

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo

Preparación de la solución para el cultivo de la bacteria

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo


Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo

Se debe preparar la solución de la bacteria en un medio de cultivo



Uña
oclar

esta Uña es
tratamiento
local de frías
ocarios.

Uña
oclar

son gotas
de medicamento
sostenidos por
el aire y por
la nariz.

Medicamentos

son aceites
que se
tratamiento
es controlar
la toxina del
dolor.

Uña de
almacenamiento
de los
Farmacos

Respetar la
Fecha de la
caducidad del
medicamento, y los
ampollas y frascos
unidos que deben
destrozar después.

Mezclas de
medicamentos
en líquidos

Los medicamentos
no deben agregarse
a soluciones que
contengan bicarbonato

Uña Intra-
molecular

Mantenimiento de
la solución inyectable
de los 4 músculos.

Parental

Transdermica

respetar la fecha de la caducidad del medicamento, y los ampollas y frascos vidriosos que deben desbarbarse.

Los medicamentos no deben colocarse a sacudones que dañen el contenido.

Monitoreo de salidas, inyectables los 4 meses.

Parental

• Inyección de infección es utilizada en los frascos con absorción deficiente en emergencias.

• sublingual
colocado debajo de la lengua

• Inhalación.
atrás de la boca.

es intravenosa
masculin subcutánea
Intradermica, intracelular

transfusión y tabletas
masticables, chupete
o masticable.

pequeño para la embocadura
de aerosoles nasales

Intradermica

Se aplica sobre la piel para que se absorba en el tejido conjuntivo.

Parches.