



Supernota

Hugo Leonel Espinosa Hidalgo

Diverticulosis

Parcial 3

Anatomía y fisiología 2

Felipe Antonio Morales Hernández

Licenciatura en enfermería

Cuatrimestre 2



Bolsas abultadas en el revestimiento digestivo




Diverticulitis cólica



A veces pueden presentarse complicaciones como:



Son comunes luego de los 40 años



El 80-85% de los pacientes permanecen sintomáticos y asintomáticos




La diverticulitis puede causar:



Frecuencia de la enfermedad







5.100 /mm ³	2.024,7 /mm ³	3.500 a 8.000 /mm ³	500 a 7.000 /mm ³
39,7 %	0 /mm ³	0 a 0 %	0 /mm ³
0 %	0 /mm ³	0 a 0 %	0 /mm ³
0 %	0 /mm ³	0 a 1 %	0 /mm ³
0 %	0 /mm ³	0 a 4 %	0 /mm ³
39,7 %	2.024,7 /mm ³	30 a 60 %	1.000 a 1.500 /mm ³
6,0 %	285,6 /mm ³	1 a 4 %	100 a 1.000 /mm ³
0,1 %	5,1 /mm ³	0 a 1 %	0 a 100 /mm ³
48,1 %	2.453,1 /mm ³	25 a 45 %	1.000 a 4.000 /mm ³
6,6 %	331,5 /mm ³	2 a 10 %	200 a 900 /mm ³
0 %	0 /mm ³	0 a 1 %	0 /mm ³

Pruebas de función Hepática

Laura Isabel Cruz Sánchez





Zonas débiles del colon
ceden bajo presión






CAUSAS

Desgarre de divertículos




FACTORES DE RIESGO





Cirugía laparoscópica



Colectomía sigmoidea




Drenaje percutáneo






Aplicar cuidados exquisitos en tubo percutáneo



En el caso de una fistula colovesical se debe colocar sonda vesical

CUIDADOS DE ENFERMERIA



La infección y la inflamación de una perforación pueden dar lugar a: