

Nombre de alumno: Carlos Enrique Maldonado Juárez

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo López

Nombre del trabajo: súper nota

Materia: Enfermería del niño y adolescente

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5to

Grupo: A

Sexualidad y conductas de riesgo en la adolescencia

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Diferencia en ella dos periodos: la adolescencia temprana, de 10 a 14 años, y la tardía, de 15 a 19 años


Hay un amplio consenso en considerarla una etapa fundamental de la vida en la que se producen procesos claves en el desarrollo y formación del individuo:

Descubrimiento de la propia identidad, maduración sexual, etc.



En 2009 la población de 15 a 24 años sufrió aproximadamente el 40% de los casos de infecciones nuevas por VIH registrados entre los adultos en todo el mundo







La edad de inicio de las prácticas sexuales completas se sitúa entre 14,15 y 15,28 años

En cuanto a la persona con la que inician sus relaciones sexuales, los hombres se dividen entre la pareja estable y una pareja ocasional o desconocida, mientras que las chicas afirman haberlo hecho con su pareja estable en un 69,6 %.



Esta iniciación más temprana supone una mayor exposición a los riesgos por carecer a esas edades de suficiente información y de habilidades para la gestión responsable de los mismos.

métodos anticonceptivos

MÉTODOS HORMONALES



Implante anticonceptivo

El implante anticonceptivo (también conocido como anticonceptivo subdérmico y que va debajo de la piel) es una varilla pequeña y delgada, del tamaño de un cerillo (fósforo). El implante libera hormonas en tu cuerpo que previenen el embarazo.



D.I.U.

El dispositivo intrauterino (DIU) es un pequeño dispositivo que se pone en tu útero para evitar embarazos. Es duradero, reversible y uno de los métodos anticonceptivos más efectivos que existen.



Píldoras anticonceptivas

Es un medicamento que contiene diversas hormonas, y se utiliza como anticonceptivo, para evitar el embarazo. uncionan al impedir que el esperma llegue al óvulo

MÉTODOS DE BARRERA

Preservativo femenino

El condón femenino brinda protección contra el embarazo y también contra las infecciones que se propagan durante el contacto sexual, como el VIH.



Preservativo masculino

Es un dispositivo de barrera con forma de funda utilizado durante una relación sexual para reducir la probabilidad de embarazo o el contagio de infecciones de transmisión sexual.





Las drogas en la adolescencia

La drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo o incontrolable de la droga a pesar de las consecuencias perjudiciales que acarrea y los cambios que causa en el cerebro, los cuales pueden ser duraderos



Estos cambios en el cerebro pueden generar las conductas dañinas que se observan en las personas que se drogan. La drogadicción es también una enfermedad con recaídas. La recaída ocurre cuando una persona vuelve a consumir drogas después de haber intentado dejarlas.

La búsqueda y el consumo de la droga se vuelven compulsivos. Esto se debe mayormente a los efectos que tiene la exposición a la droga durante largo tiempo en la función cerebral.



La adicción afecta las zonas del cerebro que participan en la motivación y la recompensa, el aprendizaje, la memoria y el control del comportamiento.

Son varias las opciones de tratamiento para la drogadicción que han dado buenos resultados. Entre ellas se cuentan:



- Orientación conductual
- Medicación
- Aplicaciones y dispositivos médicos que se usan para tratar los síntomas de abstinencia o instruir al paciente sobre el desarrollo de nuevas aptitudes
- Evaluación y tratamiento de problemas concurrentes de salud mental, como la depresión y la ansiedad
- Seguimiento a largo plazo para evitar la recaída



BIBLIOGRAFÍA

(S/f). Com.mx. Recuperado el 3 de abril de 2023, de

https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/09781c6bbb9e5aa5305340b6875cc1ce.pd

f