

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CARTILLA NACIONAL DE SALUD

NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS
CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN



VACUNAS	DOSIS	Edad que se aplica	VIA	COMPLICACION
Poliomielitis : Poliovirus atenuados tipo Sabin (VOP) Vacuna inyectada tipo Salk	0.5 ml	de 6 meses a 5 años de edad de 6 meses a 5 años de edad	Vía Oral IM o Subcutánea	
Sarampión MMR	dos dosis 0.5 ml	Primera de 12 a 15 meses segunda de 4 a 6 años	Subcutánea	Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección
Tetanos y difteria Tdap DTaP	5 dosis 0.5 ml	1. 2 meses 2. 4 meses 3. 6 meses 4. 15-18 meses 5. 4-6 años 1. 11-12 años	IV	Fiebre Vomito
Influenza LDC	Niños menores de 36 meses: una dosis de 0.5 ml. Niños de 6 a 35 meses 0.25 ml	Apartir de los 6 meses, y vacunarse Cada año.	Parenteral, intramuscular Subcutánea Profunda.	Dolor de Cabeza. Fiebre Nauseas Dolores musculares
Hepatitis Antígeno de superficie de la hepatitis B.	3 dosis. 0.5 ml.	Niños de 18 meses. 1. horas de n. 2. 2 meses 3. 6 meses.	IM	Fiebre de 38.5°C Fatiga nauseas Vomito diarrea y dolor abdominal
Rotavirus Infecciones diarreicas causadas por la misma	1.5 ml	2 y 4 meses de edad limite 8 meses	Vía Oral	Irritabilidad, diarrea y Vomitos.
Neumococo Infección respiratoria	0.5 ml	2 y 4 meses de edad refuerzo a los 12 meses.	Vía IM	Cansancio, Perdida de apetito, escalofríos
Hevavalente acelular. Tos ferina, difteria tetanos, Haemophilus	0.5 ml a los 2, 4 y 6 meses de edad.	2, 4, 6 meses de edad y refuerzo a los 18 meses.	VIA IM	Fiebre de más de 40.5 grados llanto sin Parar durante 3 horas o más continuas
Vacuna BCG Tuberculosis	0.1 ml	RN, hasta niños menores de 5 años	VIA ID Intradermica	noletia en el sitio de aplicación