



**Nombre de alumno: MARÍA CANDELARIA
JIMÉNEZ GARCÍA**

**Nombre del profesor: MARIA DEL
CARMEN LOPEZ SILBA**

**Nombre del trabajo: CARTILLA DE
VACUNACIÓN**

**Materia: PATOLOGÍA DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE**

Grado: 5

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 20 de enero de 2023

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CARTILLA NACIONAL
DE SALUD

NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS
CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN

VACUNAS	DOSIS	EDAD QUE SE APLICA	VIA	COMPLICACIONES
Poliomielitis polio virus atenuadas (VOP)	0.5 ml	De 6 meses a 5 años de edad	Via oral	
Vacuna inyectada tipo Salk		De 6 meses a 5 años de edad	IM o subcutanea	
Sarampión MMR	dos dosis 0.5 ml	Primera de 12 a 15 meses segunda de 4 a 6 años	subcutanea	• Dolor • Enrojecimiento • Hinchazón en el lugar de la inyección
Tetano y difteria Tdap DTap	5 dosis 0.5 ml	1. 2 meses 2. 4 meses 3. 6 meses 4. 15 y 18 meses 5. 4-6 años 1. 11-12 años	IV	• Fiebre • vomito
Influenza LDL	Niños menores de 36 meses. una dosis de 0.5 ml 1 niños de 6 a 35 meses 0.25 ml	Apartir de los 6 meses y vacunarse cada año.	Parenteral, intramuscular subcutanea profunda	• Dolor de cabeza • Fiebre • Náuseas • Dolores musculares
Hepatitis. antígeno de superficie de la Hepatitis B	3 dosis 0.5 ml	Niños de 18 meses 1. - horas de N. 2. - 2 meses 3. - 6 meses	IM	Fiebre de 38.5°C Fatiga Nauseas vomito
Rotavirus	1.5 ml	24 meses de edad limite 8 meses	Via oral	Irritabilidad, diarrea y vomitos.
Neumococo infección respiratoria	0.5 ml	24 meses de edad refuerzo a los 12 meses	Via IM	Cansancio Perdida de apetito Escalofríos
Hexavalente acellular toxina difteria tetanos	0.5 ml a los 2, 4 y 6 meses de edad	2, 4, 6 meses de edad y refuerzo a los 18 meses	Via IM	Fiebre de más de 40.5° llanto sin parar durante 3 horas
Vacuna BCG Tuberculosis	0.1 ml	P.N., hasta niños menores de 5 años	Via ID Intradermica	Molestia en el sitio de aplicación

(gob.mx, s.f.)

Bibliografía

gob.mx, p. (s.f.). *Cartilla Nacional de Salud*. Obtenido de Cartilla Nacional de Salud:
<https://www.pediatria.gob.mx>