



**Nombre de alumno: Marroquín  
Morales Karen Mayte.**

**Nombre del profesor: María del  
Carmen López Silva**

**Nombre del trabajo: cartilla de  
vacunación.**

**Materia: Patología del niño y  
adolescente.**

**Grado: 5 cuatrimestre.**

**Grupo: B**

GOBIERNO  
FEDERAL.

SALUD.

CARTILLA  
NACIONAL  
DE SALUD.

SEMAR.

SEDENA

SEP.

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A  
9



IMSS



ISSSTE

DIF

sistema nacional  
para el desarrollo  
integral de la  
familia



PEMEX

CURP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**IDENTIFICACIÓN**

GRUPO SANGUÍNEO Y R.H.

APELLIDOS Y NOMBRE:

AFILIACIÓN, MATRÍCULA / EXP.

UNIDAD MÉDICA:

CONSULTORIO No    No B.

**DATOS GENERALES**

SEXO:

--	--

**DOMICILIO**

CALLE Y NÚMERO

COLONIA / LOCALIDAD

MUNICIPIO / DELEGACIÓN

CP.

ENTIDAD FEDERATIVA

**LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO**

LOCALIDAD

--	--	--

DÍA MES AÑO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN / ENT. FEDER.

**LUGAR Y FECHA DE REGISTRO:**

LOCALIDAD

--	--	--

DÍA MES AÑO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN / ENTIDAD FEDERATIVA.

# ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE.	VIA DE ADM.	DOSIS	EDAD Y FREC.	FECHA DE VACUNACIÓN.
B.C.G.	TUBERCULOSIS	I. Domici. B. Derecho.	ÚNICA 0.1 ml	AL NACER.	
HEPATITIS B	HEPATITIS B	I. M. B. Izquierdo	PRIMERA 0.5 ml	AL NACER	
			SEGUNDA. 0.5 ml	2 MESES	
			TERCERA 0.5 ml	6 MESES	
PENTAVALENTE	DIFTERIA TOSFERINA TETANOS POLIOMELITIS E INFECCIONES POR: H. Influenzae b.	I. M. B. Izquierda	PRIMERA 2 gotas	2 MESES	
			SEGUNDA	4 MESES	
			TERCERA	6 MESES	
			CUARTA	18 MESES	
D.T.P.	DIFTERIA TOSFERINA Y TETANOS.	B. Izquierdo. I. M.	REFUERZO 0.5 ml	4 AÑOS	
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS	V. Oral.	PRIMERA 1.5 ml	2 MESES	
			SEGUNDA	4 MESES.	

# ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSES	EDAD Y FRECUENCIA	VIA DE ADM.	FECHA DE VACUNACIÓN
NEUMOCÓCICA CONJUGADA	INFECCIÓN POR NEUMOCOCCO B. IZQUIERDO	PRIMERA	2 MESES	0.5 ml. I.M.	
		SEGUNDA	4 MESES	1. M 0.5 ml	
		REFUERZO O. OTRAS	12 MESES	1. M. 0.5 ml	
INFLUENZA	INFLUENZA B. IZQUIERDO	PRIMERA	6 MESES	0.5 ml I.M.	
		SEGUNDA	7 MESES	1. M 0.5 ml	
		REVACUNACIÓN	ANUAL HASTA LOS 35 MESES	0.5 ml	
SRP	SARAMPION, RUBEOLA, Y PAROTIDITIS B. IZQUIERDO	PRIMERA	1 AÑO	Subcutánea	
		REFUERZO	6 AÑOS	0.5 ml	
SABIN	POLIOMELITIS	ADICIONALES.			
				2 gotas. V. Oral	
SR	SARAMPION Y RUBEOLA	ADICIONALES.		B. IZQUIERDO. Subcutánea. 0.5 ml	
OTRAS VACUNAS	V.P.H.	0.5 ml	1. M.	12 años. (mujeres).	

Qué es una vacuna:

Es un preparado que se basa en microorganismos, (muertos, debilitados), donde se administran en una persona para prevenir a tener o tratar las ENE. Infecciosas.

Cómo Funciona.

Cuando se adm. una vacuna el sistema inmunológico reconoce el antígeno, interpreta que se trata de la enfermedad y produce anticuerpos (defensas) contra esta.

Por eso si la persona entra en contacto con el microorganismo contra el cual fue vacunado en algún momento de su vida, las defensas generadas gracias a la vacuna que se encargan de protegerla para evitar la ENE. o que esta sea leve.

Síntomas que puede causar la vacuna.

Dolor

Enrojecimiento

Inflamación en el lugar de aplicación

Fiebre

Porqué son tan importantes las vacunas.

Las vacunas son herramientas importantes para la prevención de ENE.

Que puede pasar si no nos vacunamos.  
En el caso de no vacunarnos y tener contacto con el microorganismo causante de la infección podemos tener la enf. pueden producir complicaciones importantes o incluso la muerte.

### Contraindicaciones.

Son situaciones que nos indican no ddm.  
Una determinada contraindicación la vacuna.

La única contraindicación absoluta.  
Es la existencia de una reacción anafiláctica grave previa a la vacuna o sus componentes.

Son contraindicaciones para la aplicación de una vacuna.

- Fiebre  $\uparrow$  (hipertérmica) a  $40,5^{\circ}\text{C}$  tras la vacunación.
- Reacción anafiláctica tras la vacunación.
- Aparición de colapso hipotónico tras la vacunación.
- Encefalopatía grave tras la vacunación.

También hay que valorar de forma cuidadosa si se debe evitar una siguiente dosis, si tras la primera vacunación un desahucado.

- Llanto inconsolable de más de 3 horas de duración.
- Gran inflamación en la zona donde se aplicó la vacuna.
- Crisis convulsiva.

## Efectos Secundarios

Los efectos secundarios más comunes son; dolor en donde se ha administrado la vacuna, suelen ser leves y desaparecen rápidamente por su cuenta.

## Efectos secundarios más comunes

Dolor

Inflamación o enrojecimiento donde se ha adm. la vacuna.

Fiebre leve.

Escalofrío

Conjuncion

Cefalea.

Artralgia.

Mialgia.



## Referencias

salud, S. s. (21 de 01 de 2023). *programa de vacunación universal, liniamientos generales 2022*.

Obtenido de

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685855/Lineamientos\\_2022\\_PVU.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685855/Lineamientos_2022_PVU.pdf).