



**Nombre de alumno:** Brallan López Solorzano

**Nombre del profesor:** Beatriz Gordillo Lopez

**Nombre del trabajo:** Super Nota

**Materia:** Enfermería del Niño y Adolescente

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado:** 5

**Grupo:** B

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de Marzo del 2023.

# SEXUALIDAD Y CONDUCTAS DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA

La palabra adolescencia viene de la latina adolescencia, que expresa idea de crecimiento y desarrollo.



Hay un amplio consenso en considerarla una etapa fundamental de la vida en la que se producen procesos claves en el desarrollo y formación del individuo: descubrimiento de la propia identidad, maduración sexual,



La edad de inicio de las prácticas sexuales completas se sitúa entre 14,15 y 15,28 años.



## Riesgo de Infeccion

La población de 15 a 24 años sufrió aproximadamente el 40% de los casos de infecciones nuevas por VIH registrados entre los adultos en todo el mundo.



## Conductas

Los trastornos de conducta en la adolescencia son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial



# MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

## Importante

Son sustancias, objetos o procedimientos que evitan que la mujer quede embarazada.



## Aportaciones del uso

Permiten tener el control de la natalidad, ayudando a las parejas a decidir si desean o no tener hijos hasta el momento en que estén preparadas para ello.

## Tipos de Anticonceptivos

- CONDÓN FEMENINO.
- CONDÓN MASCULINO.
- PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS.
- PARCHES ANTICONCEPTIVOS.
- IMPLANTE SUDÉRMICO.
- INYECCIONES ANTICONCEPTIVAS.
- PASTILLA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA.
- DISPOSITIVO INTRAUTERINO



## Riesgos



Algunos métodos anticonceptivos pueden provocar efectos secundarios como cambios de humor, pérdida de libido, aumento de peso y dolores de cabeza. Es importante escoger el más adecuado en cada caso. Algunas personas son alérgicas al látex, por lo que deben tener cuidado a la hora de escoger un preservativo.

## USO

- Para ser eficaz, las pastillas anticonceptivas requieren que usted tome una pastilla todos los días.
- Los métodos de barrera tienen que usarse antes de las relaciones sexuales.
- Los métodos basados en la observación de la fertilidad requieren que usted preste mucha atención a su temperatura y a otras señales.