INFECCION QUE SE PRESENTA EN UN PACIENTEINTERNADO EN UN HOSPITALO EN OTRO ESTABLECIMIENTO DE SALUD. DONDE LA INFECCION NO SE HABIA MANIFESTADO.

FRECUENCIA DE LA INFECCION.

OCURREN EN TODO EL MMUNDO YAFECTAN A LOS PAISES DESARROLLADOS Y ALOS QUE CARECEN DE RECURSOS.

EFECTO DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES. ESTAS AGRAVAN LA DISCAPACIDADFUNCIONAL Y LA
TENSION EMOCIONAL DEL PACIENTEY EN ALGUNOS CASOS,
OCASIONAN TRANSTORNOS TRANSITANTES.QUE REDUCEN
LA CALIDAD DE VIDA.

FACTORES
INFLUYENTES DE
LAS INFECCIONES
NOSOCOMIALES.

- -AGENTE MICROBIANO.
- -VULNERABILIDAD DEL PACIENTE.
- -FACTORES AMBIENTALES.
- -RESISTENCIA BACTERIANA

INFECCIONES NOSOCOMIALES.

DE LAS
INFECCIONES
NOSOCOMIALES.

SON CAUSAS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD. LOS
PACIENTES HOSPITALIZADOS; SUFREN SUFREN A MENUDO
COMPROMISO INMUNITARIO. ELEVADA FRECUENCIA DE
INFECCIONES NOSOCOMIALES COMPRUEBAN LA CALIDAD
DEFICIENTE DEL SERVICIO DE SALUD.

SITIOS DE INFECCIONES NOSOCOMIALES COMUNES.

- -SITIO DE INSERCCION DE CATETER.
- -OIDOS, NARIZ, GARGANTA, OJOS.
- -VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES
- -BACTERIEMIA.
- -VIAS REPIRATORIAS.
- -PIEL Y TEJIDOS BLANDOS.
- -SITIOS DE INTERVENVION QUIRURGICA.

PORGRAMAS DE CONTROL DE INFECCIONES.

-PROGRAMAS NACIONALES O REGIONALES.
-PROGRAMAS HOSPITALARIOS.
-COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES

- -ESPECIALISTAS EN CONTROL DE INFECCIONES.
- -RESPONSABILIDAD DEL CONTROL DE INFECCIONES.
- -FUNCION DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL.

LOS LACTANTES DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA PRESENTAN SINTOMAS GASTROINTESTINALES POR TRANSTORNOS FUNCIONALES TALES COMO:

REGURGITACION

RETORNO INVOLUNTARIO DE SECRECIONES O ALIMENTOS INGERIDOS, DENTRO O FUERA DE LA BOCA, MIENTRAS QUE LOS VOMITOS SON EXPULCION VIOLENTA DE CONTENIDO GASTRICO.

CONSTIPACION.

DIFICULTAD EN LA EVACUACION O VACIAMIENTO INCOMPLETO
DEL COLON Y EL RECTO. EXPRESADO COMO HECES DURAS E
INFRECUENTES.
ALGUNAS CAUSAS SON FUNCIONALES O IDIOPATICAS.

MANIFESTACIONES DIGESTIVAS PROPIAS DEL LACTANTE.

DISQUESIA.

TRANSTORNO EVACUATORIO FUNCIONAL, TRANSITORIO Y BENIGNO DE LOS LACTANTES DDE 6 MESES, QUE PRESENTAN RETARDO EVACUATORIO, CON MANIOBRAS DE

ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL CRONICO. PRESENCIA DE DEPOSICIONES DURAS DE GRAN TAMAÑO, EVACUACIONES MENOS DE 2 A 3 VECES POR SEMANA.

SIGNOS Y SINTOMAS.

-VOMITOS. -DISTENCION ABDOMINAL. -FIEBRE. -TRANSTORNOS MICCIONALES.

LLANTO Y
COLICOS DEL
LACTANTE.

EL LLANTO PRECEDE DE HABLAR Y ES LA MANERA EN QUE EL RECIEN NACIDO EXPRESA SU MALESTAR O DESEO POR CONTACTO HUMANO

LLANTO INCONSOLABLE, QUE EMPIEZA Y TERMINA SIN CAUSA APARENTE. DURANTE 3 HORAS, 3 DIAS POR SEMANAS O 3 HORAS POR DIA DURANTE UNA SEMANA. $\frac{https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/dd24db12cfd20d9dbb}{8c8ba0db873a63-LC-}$

<u>LEN505%20ENFERMERIA%20EN%20EL%20CUIDADO%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20EL%20ADOLESCENTE.pdf.</u>