



Nombre del Alumno: Hernandez Velasco Georgina del Rosario

Nombre del tema: Cuadro sinóptico

Parcial: III

Nombre de la Materia: Enfermería del niño y del adolescente

Nombre del profesor: Beatriz

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: V

PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

DEFINICIÓN

Las infecciones nosocomiales son infecciones contraídas durante una estancia en el hospital que no se habían manifestado ni estaban en período de incubación en el momento del internado del paciente.

Las infecciones que ocurren más de 48 horas después del internado suelen considerarse nosocomiales.

TIPO DE INFECCIÓN

- Infección del sitio de una intervención quirúrgica.
- Infección urinaria.
- Infección respiratoria.
- Infección del sitio de inserción de un catéter vascular.
- Septicemia.

CRITERIOS SIMPLIFICADOS

Cualquier secreción purulenta, absceso o celulitis difusa en el sitio de la intervención quirúrgica en el mes siguiente a la operación.

CRITERIOS SIMPLIFICADOS

Cultivo de orina con resultados positivos (1 ó 2 especies) al menos con 10⁵ bacterias/ml con síntomas clínicos o sin ellos.

Síntomas respiratorios con manifestación de por lo menos dos de los siguientes signos durante la hospitalización: tos, esputo purulento, nuevo infiltrado en la radiografía del tórax, compatible con infección.

Inflamación, linfangitis o secreción purulenta en el sitio de inserción del catéter.

Fiebre o escalofrío y por lo menos un cultivo de sangre con resultados positivos.

MANIFESTACIONES DIGESTIVAS PROPIAS DEL LACTANTE

DEFINICIÓN

Los lactantes frecuentemente presentan, durante el primer año de vida, síntomas gastrointestinales por trastornos funcionales

REGURGITACIÓN

Es el retorno involuntario de secreciones o alimentos ingeridos, dentro o fuera de la boca, mientras que los vómitos son la expulsión violenta del contenido gástrico.

CONSTIPACIÓN

Dificultad en la evacuación o vaciamiento incompleto del colon y el recto, expresado como la eliminación de heces duras e infrecuentes.

DISQUECIA

Es un trastorno evacuatorio funcional, transitorio y benigno de los lactantes menores de 6 meses, sanos, alimentados con LM, que presentan retardo evacuatorio.

ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL CRÓNICO

COLICO Y LLANTO DEL LACTANTE

El llanto precede al habla y es la manera en que el recién nacido puede expresar su malestar o su deseo de contacto humano.

COLICO

Se define "cólico del lactante" al cuadro que se expresa como llanto inconsolable paroxístico, que empieza y termina sin causa aparente, durante 3 horas, 3 días por semana, 3 semanas (regla de 3 de Wessel) o 3 horas por día durante una semana.