



**Nombre de alumno: Mari Bella Pascual
Juan**

**Nombre del profesor: María Cecilia
Zamorano**

Nombre del trabajo: Súper nota.

Materia: Ginecología y obstetricia

Grado: 5

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 01 de marzo del 2023.

DISMENORREA.

Es el dolor uterino en el momento de la menstruación.

- El dolor tiende a ser más intenso 24hrs después del inicio de la menstruación y continúa por 2 o 3 días



DISMENORREA SECUNDARIA.

Se debe a anomalías pélvicas, cuando algo no es normal en el útero.



DISMENORREA PRIMARIA.

El dolor se debe a las contracciones uterinas y otros mediadores inflamatorios producidos en el endometrio secretor.



CAUSAS COMUNES.

- Endometriosis.
- Adenomiosis uterina.
- Miomas.

Comienza en la adultez (a menos que se deba a malformaciones congénitas).

FACTORES DE RIESGO.

- Edad temprana (menarca).
- Tabaquismo.
- Antecedentes familiares de dismenorrea.
- Posición uterina anómala.



SIGNOS DE ALARMA.

Dolor que no remite.
Fiebre, flujo vaginal.
Evidencia de peritonitis.
Dolor pélvico.

TRANSTORNOS MENSTRUALES.

son las alteraciones que ocurren en el cuerpo de la mujer y que están vinculados a la menstruación



TRASTORNOS MÁS FRECUENTES

- Síndrome de Ovario Poliquístico.
- Endometriosis.
- Sangrado Uterino Anormal.
- Ausencia de ciclos menstruales.
- Dismenorrea.
- Menopausia Prematura.
- Síndrome Premenstrual.

CAUSAS

- Insuficiencia ovárica primaria.
- Trastornos alimenticios (anorexia nerviosa o bulimia).
- Ejercicio excesivo.
- Anticonceptivos hormonales.
- Diabetes no controlada.

CLASIFICACIÓN

- FRECUENCIA: Amenorrea, opsomenorrea, poli menorrea, oligomenorrea.
- CANTIDAD: Hipermenorrea, hipomenorrea.
- DURACIÓN.



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Antología de la universidad del sureste(UDS)

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/16c979828766971f5b98475d56e2a1be.pdf>

d65cffe772a67f83d3673f118bfd4f0-LEC-LENGINECOLOGIAYOBSTETRICIA(pdf.)