



**Nombre de alumno:**

**Edson Daniel De Leon  
Dominguez.**

**Nombre del profesor: María Cecilia  
zamorano Rodríguez**

**Nombre del trabajo: Cuadros sinoptico**

**Materia: Ginecologia y obstetrician**

**Grado: 5to Cuatrimestre**

**Grupo: B**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 9 de Marzo Del  
2022**

# PUERPERIO PATOLOGICO, CHOQUE SEPTICO

## PUERPERIO NORMAL



Periodo que sigue de la expulsión del producto de la concepción en el que los cambios anatómicos-fisiológicos propios del embarazo se reorientan a estado pregestacional.



Este con duración de 6 semanas o 42 días.

## PATOLOGIA DE LACTANCIA



Es la ausencia de producción de leche o cantidad insuficiente para el crecimiento neonatal.

## CLASIFICACION



- Puerperio inmediato: primeros 24 horas
- Puerperio mediato: del segundo al séptimo día.
- Puerperio tardío: Día 8 al 42.

## PUERPERIO PATOLOGICO



Cuando la evolución de alguna de los parámetros normales debido a una infección o hemorragia con la consecuencia anemia o coagulopatía, enfermedad aguda o crónica, infecciosa o degenerativa.



Estos puede provocar evolución patológica de puerperio.



## FACTORES DE RIESGO:

- Causas de hemorragia
- Anemia
- Nutrición deficiente
- Inmunesupresión
- Macrosomía
- Embarazo gemelar



## GALACTOCELA

↓  
Es un quiste unido  
localizado en la zona  
central de la mama,  
en la region areolar  
del conducto, bajo la  
piel.

↓  
Se debe a la obstruc-  
cion de un conducto gal-  
actoforo que ocasiona  
la retencion de leche.

## INFECCION PUERPERAL

↓  
Es una complicacion  
obstetrica frecuente,  
la importancia de  
este tipo de infec-  
ciones reside en di-  
agnostico seguro, tra-  
tamiento eficaz, asi  
como un tratamiento  
antibiotico y vacu-  
namente quirurgico.

## ENDOMETRITIS

↓  
Es la causa mas frecuente  
de fiebre puerperal, esta se  
produce por via ascendente tras  
la colonizacion microbiana  
cervicovaginal.

## FIEBRE PUERPERAL

↓  
Se define como temperatura  
igual o superior a 38°  
al menos durante dos  
dias y entre los dias  
2° y 10° tras el parto.  
↓  
Se puede deber a causas  
genitales o extragenitales