



“Universidad del sureste”

Alumna Viviana guadalupe cruz Hernández



**DOCENTE: BARREDA
ROBERTO GARCIA SEDANO**

Cuadro sinóptico: cólicos en equinos

20/01/23

Cólicos en equinos

Que es

Dolor originado en estómago, intestino o el peritoneo que cubre esos órganos y la pared abdominal

Etiología

Se produce cuando los alimentos ingeridos por el caballo no circulan correctamente a través del intestino.

Tipos y signos

Timpánicos

Se da ante la presencia de grandes cantidades de gas que no consiguen atravesar el tubo digestivo y salir del mismo es necesario cirugía.

Impactacion

Se produce cuando los alimentos ingeridos por el caballo no circulan correctamente a través del intestino.

Espasmódico

Este cólico es de tipo intermitente, es decir, está presente durante unos 20-30 minutos y desaparece, volviendo después a aparecer. Se trata con medicinas

Torsión del intestino

Es, sin duda, el caso más grave de los cólicos en caballos. Se da cuando algunos tramos del intestino llegan a retorcerse sobre sí mismos o quedan atrapados en otra zona intestinal. El tratamiento tiene que ser por cirugía.

Tratamiento

En cólicos de impactacion: laxantes osmóticos (1 g/kg de MgSO₄ o Na₂SO₄) y/o lubricantes (2-8 mL/kg de vaselina) para ayudar a deshacer las impactaciones

Bibliografía: [Cólicos en caballos: causas, síntomas y tratamientos \(hospitalveterinariouax.com\)](http://hospitalveterinariouax.com)

