

CUADRO SINÓPTICO SOBRE RINITIS ATROFICA

BRENDA VIRIDIANA ROJAS VAZQUEZ
PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PORCINOS UDS

RINITIS ATROFICA

¿Qué es?



La rinitis atrófica es una condición con inflamación de tejidos de las fosas nasales que puede terminar causando desviación del septo nasal del cerdo.



Signos clínicos



Estornudos.
Lagrimeo.
Descargas nasales, a veces con sangre.
Distorsión del hocico.

Transición y cebo

Estornudos a menudo con manchas de sangre.
Lagrimeo.
El hocico se tuerce, se acorta y arruga.
Reducción de la ganancia diaria y crecimientos variables.

Diagnostico



Signos clínicos, especialmente hocicos desviados.
Cultivo de hisopos nasales.
Evaluación de los turbinados nasales y del septo en matadero o en necropsias en las granjas.



Transmisión



La transmisión vertical ocurre cuando las cerdas reproductoras que son portadoras transmiten las bacterias a los lechones durante la lactancia.

La transmisión es por vía horizontal cuando los lechones infectados eliminan las bacterias por las heces entre 2-3 semanas post-destete. Además, por aerosoles también hay transmisión

Tratamiento y control



La medicación impedirá se incrementa la morbilidad en la pira afectada pero no revertirá el daño en los cornetes (Rinitis Atrófica progresiva)

Vacunación de las cerdas
Medicación del alimento y agua de los lechones

Prevención



Manejo.

Control de Temperatura y Ventilación. Asegurar que el amoniaco no se concentre en las instalaciones

inmunización. Estimulando inmunidad pasiva y/o activa.

Las hembras de reemplazo deben ser vacunadas