

A cartoon illustration featuring two characters. On the left, a male character with a blue cap and a flashlight. On the right, a female character with a pink headband and a pig. The pig is pink and has a red bow around its neck. The background is white with blue borders at the top and bottom.

UDS
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MATERIA
PATOLOGÍAS Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE PORCINOS

DOCENTE
BARREDA ROBERTO GARCÍA SEDANO

ALUMNO
TRISTAN YAHIR DÍAZ MAZARIEGOS

LICENCIATURA
M.V.Z

TRABAJO
MINIGIS AGRÍCOLA

FECHA DE ENTREGA
22 DE ENERO DEL 2023

RINITIS ATRÓFICA

DIFUSIÓN

Es una enfermedad infecciosa porcina que se caracteriza por la secreción nasal serosa o mucopurulenta, el acortamiento o deformación de la jeta, la atrofia de los cornetes nasales y una reducción de la productividad.

SIGNOS CLÍNICOS

Estornudos, resoplidos y secreción ocular que da lugar a manchas oscuras en los lagrimales, y la posterior secreción nasal, que puede oscilar entre serosa y mucopurulenta; en algunos casos, los cerdos pueden presentar epistaxis.

DX

- Examen clínico
- Control en matadero
- Diagnóstico en el laboratorio.

TX

Se deben considerar técnicas como la vacunación de las cerdas (en Europa existe una vacuna combinada de toxoide de *P. multocida* y vacuna muerta de *B. bronchiseptica*) y la inyección intramuscular de un antibiótico de acción prolongada a los lechones sin destetar.

CONTROL Y PREVENCIÓN

1. Vacunación
2. Inmunidad de rebaño
3. Todo adentro todo afuera
4. Mejoramiento del manejo
5. Quimioprofilaxis

Se deben considerar técnicas como la vacunación de las cerdas (en Europa existe una vacuna combinada de toxoide de *P. multocida* y vacuna muerta de *B. bronchiseptica*) y la inyección intramuscular de un antibiótico de acción prolongada a los lechones sin destetar.

Todos los animales deben ser vacunados:

Cerdos-4-6 s.
Cerdas-4-6 s.
Lechones-1-4 s.

ZONOSIS

No es zoonótica