


02 DE ABRIL DE 2023



UDS

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

DOCENTE

BARREDA ROBERTO GARCIA SEDANO

MODULO

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PORCINOS

ALUMNA

FATIMA GUADALUPE LOPEZ MORALES

LICENCIATURA

MVZ

TRABAJO

CUADRO SIGNOPTICO



Que es

Operación quirúrgica que consiste en extraer el feto del vientre de la madre mediante una incisión en la pared abdominal y uterina y evitar

En qué casos se indica

Esta operación generalmente se practica como un recurso terapéutico cuando se presenta distocia. También en patologías reproductivas o cuando se desea obtener cerdos libres de patógenos específicos

Riesgo de la distocia

La distocia es un problema frecuente en esta especie y se debe practicar una cesárea lo antes posible por que pueden aparecer toxemias y generar tejidos y vasos friables.

Las hembras que han tenido este tipo de problemas tendrán mas probabilidad de padecer metritis e hipogalactia

Que hacer antes de la cesárea

Para hacer la cesárea se debe desparasitar a la madre una semana antes suspender el alimento solido 48hrs previamente y el liquido 24hs antes mantener la cerda el lugar y los lechones limpios y a temperatura adecuada

Como es un parto normal

Como es un parto normal en la especie porcina dura una media de 140 minutos y un máximo de 5 horas el lechón suele salir con la cabeza por adelante o de nalgas con las patitas estiradas los últimos cerditos pueden morir en el parto. Las hembras muy jóvenes suelen tener mas problemas al igual que las mayores de tres años.

Signos clínicos

La construcción de nidos, inflamación de la glándula mamaria, ansiedad, eyección de leche, inflamación y edematizacion de la vulva, cambios en la frecuencia respiratoria, contracciones abdominales, movimientos de la cola, expulsión de líquido y expulsión de meconio. todos estos cambios comportamentales y fisiológicos de las hembras, e llevan a cabo despues de los 100 días de la gestación.



IMÁGENES

