

# Universidad del sureste

## Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

En cumplimiento de la materia de Patología y T. Quirúrgicas de Equinos

Presentado por la alumna Priscila Alejandra Muñoz de León

Dirigido al docente MVZ. Roberto Garcia Sedano.

Para el desarrollo al tema Cesarea en cerdas.

Tapachula de Córdoba y Ordoñez a 1 de Abril del 2023.

C  
E  
S  
A  
R  
E  
A

Es una intervención quirúrgica en la cual se realiza una incisión en el abdomen (laparotomía) y el útero de la madre para extraer a los cerdos.

La incisión cutánea se hace longitudinal, unos 2 transversos de dedo por encima del borde dorsal de la región mamaria y paralelamente a el, de unos 16 a 18 cm de largo y lo más cerca posible del pliegue de la babilla por debajo del mismo. El tejido adiposo subcutáneo y subperitoneal de la herida se quitan porque puede necrosarse y perturbar.

Pasos:  
Después de practicar la sedación y anestesia regional o general, la cerda se coloca en decúbito lateral izquierdo con las extremidades extendidas, la pata debe elevarse y moverse hacia atrás para extenderla antes de ser asegurada en esta posición.

La incisión de la matriz se hace de 10 a 15 cm de longitud en la curva mayor de una ampolla, lo más cerca posible de la bifurcación para que por esta única herida se puedan extraer todos los fetos. Elevando la matriz relajada, y comprimiéndola levemente por fuera, los fetos van deslizándose hacia la herida.

Luego de la extracción de cada feto. Las membranas fetales deben extraerse. Los bordes de la herida se unen después de tirar del hilo en una línea de zig- zag serosa con serosa formando una cresta hacia adentro. Se cierra la cavidad uterina introduciendo en ella un medio antiséptico. Luego se continúa con sutura de colchonero hasta por encima del ángulo superior de la herida, desde tal punto de modo recurrente y cubriendo la sutura primera, no continua, suturando igual hasta el ángulo inferior de la herida, y en él se anuda el hilo con el extremo inicial del mismo.

Se lava a la cerda con agua caliente y jabón. La limpieza del campo operatorio del lado izquierdo por encima de la región mamaria se hace con agua y jabón y luego se rasura y pinta con tintura de yodo. La mesa de operaciones puede ser una tabla de quita y pon cóncava y con agujeros, con mangos para llevarla. Esta tabla puede ser sustituida por una escalera con travesaños limpia.

La piel se sutura con puntos de seda en forma de cresta con doble perforación y anudamiento lateral. La herida externa se protege cubriéndola con una capa delgada de algodón empapado en tintura de yodo y gasa que se sujeta con vendaje adhesivo. Para que se produzca una curación segura, es importante la protección antibiótica general mediante la inyección intramuscular de 200.000 unidades de Penicilina Procaína por cada 50 kilos de peso.





Fotografía 5

Incisión por planos (**Torres**)



Fotografía 12

Sutura de la piel (**Torres**)