



# CISTICERCOSIS

BRENDA VIRIDIANA ROJAS VAZQUEZ PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE  
PORCINOS MVZ. BARREDA ROBERTO GARCIA SEDANO

# Cisticercosis

Enfermedad parasitaria de cerdos y humanos causada por *Taenia solium* (específicamente por la fase larvaria denominada *Cysticercus cellulosae*).  
El hombre se infecta cuando come carne de cerdo infestada con cisticercos

## Transmision

Contacto directo vía fecal-oral

Los huevos salen del hospedador mediante las heces.

Una vez ingeridos los huevos, salen las oncosferas o embriones

## Signos clínicos

La cisticercosis en cerdos es generalmente asintomática, aunque puede existir diarrea, inapetencia, vómitos

Adelgazamiento, parálisis y disnea. Los nódulos usualmente observados son blandos, no inflamados y no dolorosos.

## Dx de Laboratorio

Muestra a coleccionar: El 50% de los cisticercos se encuentran en los maseteros, 50% en el diafragma y 40% bajo la superficie de la lengua.

Pruebas diagnósticas: Inspección postmortem mediante un diagnóstico clínico.

## Control

Evitar consumo de heces en cerdos para cortar el ciclo del parásito

Educación sanitaria a la población susceptible