



“Universidad del sureste”

Alumna Viviana guadalupe cruz Hernández



**DOCENTE: BARREDA ROBERTO
GARCIA SEDANO**

**Cuadro sinóptico:
CESAREA EN CERDAS**

02/03/23

CASTRACION EN CERDAS

ESTA INDICADA

Cuando han transcurrido 30-45 minutos desde el nacimiento del último lechón, Si han pasado 24 horas desde que se observasen los primeros signos de parto inminente y no ha sido expulsado ningún lechón, Cuando la cerda no es capaz de parir a pesar de presentar fuertes contracciones uterinas.

SEDANTES Y DOSIS

AZAPERONA 2MG/KG IM
ACEPROMACINA 0.1-0.2 MG/KG IV
LIDOCAINA 2% 1ML/10 KG DE PESO

CESÁREA EN CERDAS

Procedimiento

- Se realiza la técnica epidural, con agujas de calibre 16 y 18
- Después de practicar la sedación y anestesia regional o general, la cerda se coloca en decúbito lateral izquierdo con las extremidades extendidas, la pata debe elevarse y moverse hacia atrás para extenderla antes de ser asegurada en esta posición
- El abordaje ventrolateral supramamario es el sitio quirúrgico de elección. Este sitio evita los vasos sanguíneos mamarios, posee menor cantidad de tejido graso, presenta menos riesgo de contaminación de la herida
- Se realiza una incisión cutánea de entre 15 y 20 cm de longitud, a una distancia de 5 cm dorsalmente a la glándula mamaria y cranealmente a la región inguinal
- Los músculos abdominales y el peritoneo se seccionan mediante el uso de tijeras y pinzas
- El cuerno uterino más cercano a la incisión se exterioriza en forma parcial y se hace una incisión de 6 a 8 cm
- el sitio para esta incisión debe ser lo más cercano posible a la bifurcación de los cuernos uterinos para facilitar el retiro de los lechones de ambos cuernos por la misma incisión. Los fetos se van empujando mediante masaje en dirección a la incisión realizada, mientras que con la otra mano se extrae el feto
- A veces será necesario penetrar con la mano en el cuerno uterino, para poder movilizar los fetos. Las placentas se deben retirar simultáneamente, siempre que se puedan soltar fácilmente para evitar lesionar el endometrio.
- En la cavidad uterina se colocan de 4 a 5 bolos con antibiótico como la tetraciclina. La pared uterina se sella con un patrón de sutura invaginante, continuo y no perforante como el patrón de Utrecht) con material absorbible sintético del número 0. Se debe utilizar solución salina tibia para lavar el útero a fin de reducir el riesgo de adherencias posteriores a la operación. Los músculos con sus fascias y el peritoneo se reconstruyen con puntos en X y se refuerzan con un súrgete continuo simple con material absorbible sintético del número 1



CUIDADOS POST CESAREA

Pocas horas después de terminar de parir, la cerda se levanta sin problema a beber agua, (algunas veces busca alimento), La cerda debe estar tranquila, sin signos de dolor y llamando a sus lechones para amamantarlos., Al ofrecerle alimento en el tiempo correcto se acerca a comer, Buena producción de leche, que se refleja en la calidad de sus lechones, Va aumentando paulatinamente el consumo de alimento.

4 a 6 horas previas al parto son suficientes en restricción de alimento, y máximo 8 horas postparto servir alimento a la cerda, Comenzar a ofrecer cantidades pequeñas de alimento a la cerda después del parto, Si parió por la mañana. Ofrecer 1.0 kg de alimento lactancia por la tarde, Si parió por la tarde-noche. Ofrecer 1.0 kg de alimento por la mañana siguiente, Estimular a la cerda, levantarla (cuidando la camada), que beba agua, que se acerque al comedero, etc., El consumo de alimento deberá ir aumentando en cantidad y frecuencia de servidas conforme la edad de lactancia.

Mantener comedero limpio,

Ofrecer siempre alimento limpio y fresco.

BIBLIOGRAFIA:

[Cuidados de la cerda en maternidad \(porcicultura.com\)](http://porcicultura.com)

[Cesárea en cerda, ¿realmente es una opción poco rentable y destinada al fracaso? \(porcicultura.com\)](http://porcicultura.com)