



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE PORCINOS

CUADRO SINOPTICO

ALUMNA VIVIVANA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ

DOCENTE: BARREDA ROBERTO GARCIA SEDANO

RINITIS ATROFICA

DEFINICION

Es una enfermedad infecciosa porcina que se caracteriza por la secreción nasal serosa o mucopurulenta, el acortamiento o deformación de la jeta, distorsión del tabique nasal, y torsión de la mandíbula superior

SIGNOS CLINICOS

Estornudos, resoplidos y secreción ocular que da lugar a manchas oscuras en los lagrimales, y la posterior secreción nasal, que puede oscilar entre serosa y mucopurulenta; en algunos casos, los cerdos pueden presentar epistaxis.

DIAGNOSTICO

RINITIS POR B. BRONCHISEPTICA

Se caracteriza por toses y estornudos en lechones de 3 a 4 semanas de edad, acompañado por congestiones nasales, rinitis, descargas mucopurulentas nasales como oculares, se caracteriza por atrofia en los cornetes nasales ventrales (aislamiento bacteriológico a partir de lavado pulmonar)

RINITIS POR MULTOCIDA, TOXIGENICA

Se desarrolla en cerdos entre 4 y 12 semanas de edad, se acompaña de estornudos y ronqueras, con una rinitis catarral, el cuadro más característico es una deformidad facial que se caracteriza por desviación del tabique nasal, braquignatía superior y pliegues cutáneos de la parte dorsal de la nariz

- rayos x, para observar la atrofia de los cornetes

TRATAMIENTO Y CONTROL

Vacunación en las cerdas, medicación en alimento y bebida de los lechones, buen manejo de ventilación en las instalaciones, inyecciones parenterales de suldadoxina o sulfadiazina con trimetoprima para contrarrestar la neumonía depoblación y repoblación con cerdos libres de p. multocida toxigenica , fumigación y limpieza de instalaciones y erradicación de portadores como ratones.

PREVENCION

Animales adultos deben ser vacunados dos veces con 4- 6 semanas de intervalo. Las vacunas modernas son muy eficientes. Las cerdas deben ser vacunadas 4 - 6 semanas antes de cada parto. A veces, los lechones también son vacunados a las 1 y 4 semanas de edad.

En Europa existe una vacuna combinada de toxoide de P. multocida y vacuna muerta de B. bronchiseptica) y la inyección intramuscular de un antibiótico de acción prolongada a los **lechones** sin destetar.

BIBLIOGRAFIA:

www.google.com/search?q=prevencion+para+rinitis+atrofica+en+porcinos&sxsrf=AJOqlzXUXYMN gYL33RruMg4u6MEb-KLuJg%3A1674230646216&ei=drvKY8PwDM6gkPIPqYOa-Ak&ved=0ahUKEwjDg8KXw9b8AhVOEEQIHambBp8Q4dUDCA8&uact=5&oq=prevencion+para+rinitis+atrofica+en+porcinos&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoAE6BwgjEOoCECc6CwgAEIAE ELEDEIMBOg4ILhCDARDUAhCxAxCABDoICAAQsQMQgwE6CwguEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoECAA QQzoHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoICAAQgAAQsQM6BggAEBYQHjoICAAQFhAeEAo6CA gAEBYQHhAPOggIIRAWEB4QHToKCCEQFhAeEA8QHToECCEQFUoECEEYAEoECEYYAFCzCliOX2CmY WgBcAF4AIAB_wGIAdQwkgEGMC40MS4ymAEAoAEBsAEKwAEB&scient=gws-wiz-serp

[PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PORCINOS \(plataformaeducativauds.com.mx\)](http://plataformaeducativauds.com.mx)

[CHAPTER 2 \(woah.org\)](http://woah.org)