



UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE

DOCENTE

ETY JOSEFINA ARREOLA
RODRIGUEZ

MODULO

PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS

ESPECIES

ALUMNA

FATIMA GUADALUPE LOPEZ
MORALES

LICENCIATURA

MVZ

FLOUNDER13

TECNICAS QUIRURGICAS

. Cirugía de esterilización

la **esterilización de perros**, tanto machos como hembras. Se trata de una intervención cotidiana en las clínicas de pequeños animales, que cada vez se realiza con mayor frecuencia. Aun así, es una cirugía que sigue suscitando dudas en los cuidadores y las responderemos a continuación. **Castrar perros** impide su reproducción y es, por lo tanto, una operación muy importante para evitar que un buen número de animales sufran el abandono.

Signos de dolor durante más de una semana (temblores, esconderse, babear). Enrojecimiento, hinchazón o hematomas agudos en el lugar de la incisión. Sangrado constante o pus en el lugar de la incisión. Vómitos o diarrea durante más de 24 horas después de la intervención.

Prevención En general, para machos y hembras, hay quienes recomiendan la esterilización temprana (en el caso de las perritas, incluso antes del primer celo), porque sostienen que puede prevenir el desarrollo de tumores mamarios.

Cesarea

La cesárea en perras es una intervención quirúrgica que se realiza cuando el parto natural no es posible o seguro para la madre o los cachorros.

prevención la necesidad de una cesárea, se recomienda llevar a cabo un seguimiento del embarazo de la perra y acudir al veterinario si se observan signos de problemas.

signos de problemas incluyen leche en las mamas, descenso de la temperatura corporal por debajo de 37.1°C durante 24-48 horas antes del parto, dejar de comer o comer menos y buscar un sitio, mantas, caja... (“hacen el nido”).

Después de una cesárea, las perras deben descansar durante 7 a 10 días y no correr, saltar o jugar². Es preferible llevar a la madre con correa al baño y caminar —también con correa— 3 veces al día durante 15 minutos para estimular su organismo

TECNICAS QUIRURGICAS

prolapso rectal

en los perros se produce cuando una parte del recto sobresale del ano. La condición es tratable y ocurre comúnmente en cachorros menores de 6 meses. La fuerza enérgica y prolongada debido a constipación, diarrea, parásitos o una obstrucción puede llevar al prolapso rectal.

Síntomas En el prolapso mucoso lo que podremos observar saliendo del ano será una especie de rosquilla formada por un anillo de tejido que estará inflamado y enrojecido. En este punto hay que aclarar que, aunque algunos cuidadores confunden este prolapso con hemorroides en perros, lo cierto es que los perros no tienen hemorroides tal y como las conocemos en los humanos.

Prevención La mejor manera de evitar que ocurra un prolapso rectal en su perro es evitar que se esfuerce para defecar. La diarrea, el estreñimiento, los parásitos y otras causas de esfuerzo pueden necesitar medicamentos, dietas especiales o suplementos como tratamientos. Cuanto antes se aborde el esfuerzo, es menos probable que ocurra un prolapso rectal.

hernia umbilical

en perros es un problema médico muy frecuente en perros. Aunque los perros no tienen ombligo, esta suele ser una zona muy común para la aparición de hernias, ya que es allí donde sale el cordón umbilical cuando son cachorros. Estos bultos consisten en tejidos de grasa, que suele aparecer y desaparecer, pero es vital no tocarlas o manipularlas.

síntomas pueden ser:

Dolor

Vómitos

Micciones frecuentes

Falta de apetito.

Algunas de las causas pueden ser el cierre del cordón umbilical contaminado de grasa o tejido. Además, se puede detectar que un perro puede tener este problema cuando hay:

Aumento del tamaño

Dolor en la zona

Vómitos

Debilidad

Pérdida del apetito