



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS
DE OVINOS Y CAPRINOS

CUADRO SINOPTICO

ALUMNA VIVIVANA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ

DOCENTE: SERGIO CHONG VELAZQUEZ

RINITIS ATROFICA

DEFINICION

Es una enfermedad cutánea viral, zoonótica y altamente contagiosa que afecta a las ovejas

ETIOLOGIA

El ectima contagioso se debe a la infección por el virus orf, un miembro del género

LESIONES CUTANEAS QUE PRODUCE

Suelen producirse en hocico, ubre, boca y en patas

MECANISMO DE TRANSMISION

El virus se encuentra en lesiones cutáneas y costras, y se piensa que ingresa en la piel a través de cortes y abrasiones al igual que por contacto directo y fómites

PERIODO DE INCUBACION

En las ovejas y cabras es de 2 a 3 días

PRUEBAS DE DIAGNOSTICO

Se puede confirmar mediante microscopía electrónica de la costra, de una pequeña biopsia o de líquido de la lesión, PCR y serología

SIGNOS CLINICOS

Los primeros signos son las pápulas, las pústulas y las vesículas que se encuentran en los labios, la nariz, las orejas y/o los párpados, y ocasionalmente en las patas o en la región perineal.

TRATAMIENTO Y CONTROL

No existe un tratamiento específico para el ectima contagioso. Se ha utilizado diatermia y criocirugía para tratar lesiones intraorales en corderos pero puede resultar costoso. Se pueden utilizar repelentes para mantener a las moscas alejadas de las heridas

BIBLIOGRAFIA:

[Contagious Ecthyma \(iastate.edu\)](http://iastate.edu)