

UDS
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

DOCENTE

SERGIO CHONG VELÁZQUEZ

MATERIA

PATOLOGÍA Y TÉCNICA
QUIRÚRGICA DE OVINOS Y
CAPRINOS

TRABAJO

ECTIMA CONTAGIOSA

ALUMNO

Tristan Yahir Diaz Mazariegos

Licenciatura

IN.V.2

FECHA DE ENTREGA
01 DE ABRIL DEL 2023



ECTIMA CONTAGIOSA

E.C

Etiología

El ectima contagioso se debe a la infección por el virus orf, un miembro del género Parapoxvirus en la familia Poxviridae.

QUE ES

Es una enfermedad cutánea viral, zoonótica y altamente contagiosa que afecta a las ovejas, las cabras y algunos otros rumiantes domésticos y silvestres.

LESIONES

CUTÁNEAS

Son dolorosas y suelen producirse en la boca y el hocico, donde pueden causar anorexia e inanición.

EN UBRE

Pueden causar el abandono de las crías y las lesiones en las patas pueden causar cojera transitoria.

**SIGNOS
CLÍNICOS**

Los primeros signos son las pápulas, las pústulas y las vesículas que se encuentran en los labios, la nariz, las orejas y/o los párpados, y ocasionalmente en las patas o en la región perineal. También pueden producirse lesiones dentro de la boca, especialmente en los corderos jóvenes.

E.C

TRANSMISIÓN

El virus orf se encuentra en lesiones cutáneas y costras, y se piensa que ingresa en la piel a través de cortes y abrasiones. Por contacto directo y en fómites.

TRATAMIENTO

Es paliativo y generalmente consiste en apósitos húmedos, antisépticos locales, inmovilización de los dedos y/o antibióticos para tratar las infecciones bacterianas secundarias. Las lesiones grandes se pueden extirpar mediante cirugía, y se pueden utilizar el curetaje y la electrodisecación para las lesiones persistentes.