



NOMBRE DEL DOCENTE:
MVZ. ETY JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ.

MATERIA:
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA VETERINARIA

TRABAJO:
ANORMALIDADES DESPUÉS DEL PARTO



Los trastornos reproductivos post-parto son uno de los principales problemas con los cuales se debe tener en cuenta y tratar de prevenirlos.

Entre los principales trastornos reproductivos post-parto se pueden mencionar: quistes ováricos, retención de placenta, metritis, piometra, anestro difícil.

FACTORES PREDISPONENTES DE ANOMALÍAS POST-PARTO

- ❖ Factores nutricionales.
- ❖ Factores ambientales.
- ❖ Distocia
- ❖ Genéticos
- ❖ Quistes ováricos

ANORMALIDADES DESPUÉS DEL PARTO

El útero al momento del parto es susceptible a una invasión bacteriana

Las anomalías de la involución uterina no pueden ser diagnosticadas por medio de palpación rectal durante la primera semana después del parto. Durante este tiempo los úteros normales y anormales están fuera del alcance del examinador y no se pueden retractor el útero seguramente.

El fluido normalmente no debe de palparse dentro del lumen del útero por 14-18 días post-parto si la involución uterina es normal.

La reducción del tamaño y reparación histológica del endometrio se da por completo a los 40-50 días