

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y  
ZOOTECNIA**

**GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

**CATEDRATICO: ETI JOSEFINA  
ARREOLA RODRIGUEZ**

**ALUMNA: RAQUEL VIRGINIA  
RZO ESCALANTE**

**Mapa conceptual**

**ANORMALIDADES DEL PARTO**

**02/04/2023**

# Anormalidades después del parto

Entre los principales trastornos reproductivos post-parto se mencionan quistes ováricos, retención de placenta, metritis, piometra, anestro difícil.

Entre sus 5 anomalías

Factores nutricionales.  
Factores ambientales  
Ayuda al momento del parto.  
(distocia)  
Genéticos  
Quistes ováricos.

Nutricional y de Manejo: La nutrición de un animal preñado y su manejo en el momento del parto se relacionan estrechamente y pueden constituir las causas básicas de la distocia, a menudo se observa en primíparas debido al pequeño tamaño de la madre.

“parto difícil”; y en el lenguaje obstétrico se usa para designar el parto que no puede realizarse con la fuerza de la madre solamente, es decir, del parto que tiene lugar con intervención manual o solamente, es decir, del parto que tiene lugar con intervención manual o

Cualquier infección o enfermedad que afecte al útero grávido y a sus contenidos puede provocar aborto, inercia uterina, muerte fetal y, a veces, metritis séptica de gestación. En cualquier infección grave del útero la pared uterina puede perder su tono o capacidad de contraerse, estado que produce una dilatación incompleta de la cervix e inercia uterina

Determinados factores hereditarios pueden afectar a la madre directamente o al producto y provocar un parto distócico