



UNIVERSIDAD DEL SURESTE.  
CAMPUS TAPACHULA.  
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA  
ANORMALIDADES DEL PARTO.

ALUMNO: ALEJANDRO MORALES TAPIA.  
MVZ: ETY ARREOLA R.  
OCTAVO CUATRIMESTE.  
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.



# Anormalidades del parto.

En la actualidad, los problemas al parto y postparto siguen siendo uno de los problemas más frecuentes de la práctica diaria a nivel rural. La dificultad al parto, la retención de las membranas fetales y los prolapsos uterinos afectan el rendimiento reproductivo futuro de la vaca al incrementar los días abiertos,

## laceraciones del canal de parto.

son los desgarros vaginales que ocurren cuando hay un parto distosico generalmente ocurre cuando hubo una extracción forzada por parte del operador.

sus causas se deben a lo siguiente:  
 -extraer el feto cuando el canal de parto no está relajado o dilatado.  
 -feto grande.  
 -posición ddefectuosa del becerro.

signos clinicos:  
 pujos intermitentes.  
 -elevación de la cola.  
 -edema vulvar.

. utilizar antocoagulantes para evitar hemorragias.  
 -antibióticos.



## Retención placentaria.

esta patologia ocurre cuando las membranas fetales no son expulsadas de manera adecuada en un periodo de 12 hrs postparto

causas: estas están asociadas generalmente a deficiencias en vinerales y vitaminas A y D, selenio etc.

signos clinicos:  
 visualmente podemos ver la placenta retenida.  
 -olor fetido.  
 -flujo abundante

tratamientos.  
 lavados uterinos a base de oxitetraciclina.  
 bolos intrauterinos.  
 oxitocina.



## prolapso uterino.

ocurre cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran y debilitan hasta el punto de que ya no proporcionan suficiente sostén al útero. En consecuencia, el útero se desliza hacia la vagina o sobresale de ella

causas.  
 -partos distosicos.  
 -membranas fetales retenidas.  
 -hipocalcemias.  
 -falta de minerales.

Tratamiento.  
 este consiste en meter el utero a su lugar, pero antes desinflamandolo a con hielos y agua helada, posteriormente azucar, desinfectandolo y suturando para que no se vuelva salir, ademas de administrar antibioticos.

