UNIVERSIDAD DEL SURESTE.

CAMPUS TAPACHULA.



GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

GESTACION EN BOVINAS, EQUINAS, PORCINAS, OVINAS, CANINAS, FELINAS

ALUMNO: ALEJANDRO MORALES TAPIA.
MVZ: ETY ARREOLA R.
OCTAVO CUATRIMESTE.
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

GESTACIÓN EN LAS DIFERENTES ESPECIES.

VACA.

Duración de gestación. 9 meses o 270-80 días dependiendo raza, sexo,.

son animales reproductivos durante todo el año su ciclo estral es cada 21 dias.

si luego de 21 días de que el macho haya servido a la hembra no se repite el celo, podemos asumir que la fertilización ha tenido éxito.

. Su alimentación deberá ser reforzada, sobre todo cuando se encuentre a término del embarazo, para lo cual se puede agregar en su dieta cereales y granos.

YEGUA.

11 meses o 330-360 días

Una yegua sana y con buen estado de salud podría llegar a tener durante su **vida fértil (Desde los 4 hasta los 15 años habitualmente) hasta diez embarazos**.

Uno de los síntomas que puedes notar y que indicará que el parto comienza a acercarse es aquel instante en el que **la leche comienza a manar de sus ubres en forma de chorros de manera intermitente**.

cantidad de crias 1 por parto

CERDA.

3 meses 3 semas 3 días o 114 días.

alcanzan su pubertad a los 5 meses pero son reproductivas hasta los 7 meses.

6 o. 7 partos como máximo, pasado este tiempo generalmente son destinadas al matadero las cerdas menos prolíficas

cuando se acerca el momento de dar a luz: buscan la soledad y la tranquilidad en su entorno. Generalmente los partos son propensos a darse también de noche.

Una camada de lechoncitos puede tener entre 10 y 12 ejemplares, aunque este número estará determinado por factores como la raza porcina y la cantidad de pariciones que ha tenido hasta el momento la madre.

OVINA.

5 meses o 150 días

la pubertad se presenta **entre 6 y 18 meses de edad** cuando las ovejas tienen 50 a 70 % de su peso adulto y se encuentran en la época reproductiva

El animal se separa de los demás. La vulva se inflama y la piel está suelta. El animal se muestra inquieto y no come bien. Unos días antes del parto, la vulva expulsa un líquido mucoso. La oveja se tumba y estirando el cuello hacia atrás mira hacia arriba (mira al cielo) lamiéndose los labios. La oveja se esfuerza para expulsar el cordero

el numero de corderos generalmente es de 1 pero depende de la raza pueden ser 2, max hasta 3

CANINA.

2 meses o 58.68 días.

madurez sexual entre los seis y doce meses de edad

las razas pequeñas más propensas a tener embarazos largos, mientras que en las de mayor tamaño generalmente son más cortos.

Un período de parto normal puede transcurrir entre 12 y 24 horas, aunque en las perras primerizas se puede prolongar hasta 36 horas.

, los cachorros pueden nacer cada 15 minutos o demorarse por espacio de horas. Si luego de 8 horas de trabajo de parto con contracciones

FELINA.

62-67 días

las hembras están aptas generalmente a los 4 o 5 meses para reproducirse.

Lo común es que las hembras gestantes pierdan el apetito antes de dar a luz, se muestren inquietas, se laman el abdomen y maúllen con intensidad.

el primer gatito nace alrededor de una hora después de haber comenzado el parto, el resto puede ir naciendo en intervalos que oscilan entre 10 y 60 min. No es poco común que las gatas tomen un descanso intermedio y los nacimientos se retrasen 24 o incluso 48 horas.

promedio de entre tres y seis cachorros, aunque en las camadas más grandes estas cifras pueden elevarse hasta nueve