

Nombre del alumno: Jeniffer Yuleni Maldonado Zunun

Nombre de la materia: ENFERMERIA CLINICA II

Tema: SINCOPE

-SHOCK CARDIOGENO

Nombre del profesor: María José Hernández Mendez

Nombre de la licenciatura: Licenciatura en Enfermería

Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre






♥ ¿QUE ES?

Es la pérdida transitoria y auto limitada del conocimiento y el tono postural por disminución del flujo sanguíneo cerebral.

♥ El paciente con síncope tiene aspecto pálido y pulso débil, rápido o irregular.



♥ PUEDE SER PROVOCADO POR

- Un ambiente cálido o tumultuoso
- alcohol
- Fatiga
- Dolor
- Hambre
- Posición de bipedestación prolongada

SINCOPE

♥ DIAGNOSTICO:

El diagnóstico diferencial suele ser entre el síncope y una convulsión generalizada. Los pacientes con síncope a menudo describen una transición estereotípica desde la conciencia hasta la inconsciencia que ocurre al cabo de algunos segundos.



♥ CONVULSIONES

Las convulsiones se presentan en forma muy súbita sin una transición o van precedidas de síntomas premonitorios como una sensación de distensión epigástrica, percepción de olores singulares o pensamientos acelerados.

♥ TRATAMIENTO


Los pacientes con síncope mediado por factores neurales deben recibir instrucciones para evitar situaciones o estímulos que provoquen ataques.

- La farmacoterapia
- Los antagonistas adrenérgicos β
- los inhibidores de la recaptación de serotonina
- bupropión de liberación sostenida



♥ TROMBOLOSIS

La terapia trombolítica ha mostrado consistentemente disminuir la mortalidad en pacientes con infarto del miocardio, así como disminuir la incidencia de choque cardiogénico



♥ ¿QUE ES?

El choque cardiogénico es la disminución del gasto cardiaco con evidencia de hipoperfusión tisular en presencia de volumen intravascular adecuado.



♥ MEDICAMENTOS

- El uso de nitratos
- Betabloqueadores e IECA puede exacerbar la hipotensión, por lo que en general se evitan hasta que el paciente se estabiliza.

SHOCK CARDIOGENICO


♥ PREVENCIÓN

- Evitar el consumo de tabaco
- Mantener una alimentación saludable
- Evitar consumir mucha sal
- Limitar el consumo de alcohol
- Mantener un peso saludable



♥ SINTOMAS

- Respiración rápida
- Falta de aire
- Latidos del corazón rápidos y repentinos
- Pulso débil
- Presión arterial baja
- Sudoración
- Piel pálida



FUENTE BIBLIOGRAFICA:

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/e7811923ca99ace49afd3acdb58c4b9-LC-LEN501.pdf>