

 

# UDES

**Karina Mendoza Cruz**  
**Lic: Olga carolina Montero Reyes**  
**súper nota**  
**10/03/23**



# CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE

1

## Definición

ES UNA ABERTURA PERSISTENTE QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS DOS VASOS SANGUÍNEOS PRINCIPALES QUE SALEN DEL CORAZÓN.

2

## Síntomas

- MALA ALIMENTACIÓN, QUE LLEVA A UN CRECIMIENTO DEFICIENTE
- SUDORACIÓN AL LLORAR O COMER
- RESPIRACIÓN ACELERADA O FALTA DE ALIENTO PERSISTENTES
- CANSANCIO FÁCIL
- FRECUENCIA CARDÍACA ACELERADA

## Causas

LA APERTURA ANORMAL HACE QUE CIRCULE DEMASIADA SANGRE HACIA EL CORAZÓN Y LOS PULMONES DEL BEBÉ. SI NO SE TRATA, PUEDE AUMENTAR LA PRESIÓN ARTERIAL EN EL BEBÉ (HIPERTENSIÓN PULMONAR) Y EL CORAZÓN DEL BEBÉ PODRÍA AGRANDARSE Y DEBILITARSE.

3

## Factores de riesgo

- NACIMIENTO PREMATURO.
- ANTECEDENTES FAMILIARES Y OTRAS AFECCIONES GENÉTICAS
- INFECCIÓN POR RUBÉOLA DURANTE EL EMBARAZO. Y OTRAS.

4

## complicaciones

5

- PRESIÓN ARTERIAL ALTA EN LOS PULMONES.
- INSUFICIENCIA CARDÍACA.
- Infección cardíaca (endocarditis).

## Prevención

BUSCA ATENCIÓN MÉDICA PRENATAL TEMPRANA, INCLUSO ANTES DE QUEDAR EMBARAZADA.

6

## Diagnostico

7

ECOCARDIOGRAMA. RADIOGRAFIA DEL TORAX ENTRE OTROS

8

