



# Mi Universidad

## Cuadro Sinoptico.

***Nombre del Alumno: Adrian de Jesus Santiz Toledo.***

***Nombre del tema: Enfermedades en Porcinos.***

***Parcial: 4ºto.***

***Nombre de la Materia: Patología y Técnicas Quirúrgicas de Porcinos.***

***Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno López.***

***Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.***

***Cuatrimestre: 5toº.***

***Matricula: 409421302.***

PASIÓN POR EDUCAR

***Ocosingo, Chiapas a 01 de abril del 2023.***

## Fármacos en cirugía en Porcinos

### Acepromacina.

Posología. 0,1-0,2 mg/kg IV, IM o SC

Contraindicaciones. Disfunción hepática.  
Enfermedad cardíaca.  
Debilitamiento general.

Efectos secundarios. Hipotensión.  
Protrusión del pene.  
Tumefacción.  
Sudoración.

Sinergias. Ketamina: Para potenciar efecto.  
Procaína: Su actividad puede verse favorecida por las fenotiacinas

### Azaperona.

Posología. 2,2 mg/kg IM profundo

Contraindicaciones. No debe ser administrada por vía W ya que los cerdos pueden manifestar una fase excitatoria significativa.

Efectos secundarios. Evitar su uso en condiciones muy frías, ya que puede producirse un colapso cardiovascular secundario a una vasodilatación periférica.

Sinergias. No exceder la dosis recomendada en los verracos ya que la droga puede causar extrusión peneana.

Efectos secundarios. Salivación.  
Jadeo.  
Temblores transitorios,

Sinergias. DEPRESORES DEL SNC Pueden causar una depresión aditiva del SNC al ser usados conjuntamente con butirofenonas

### Pentobarbital

Posología. 15-30 mg/kg, IV, hasta efecto.

Contraindicaciones. Usar con cautela en pacientes hipovolemicos.  
Enfermedad cardíaca o respiratoria.

Efectos secundarios. Excitación.  
Hipotermia.

Sinergias. Fenitoína. Los barbitúricos pueden afectar el metabolismo de la fenitoína y ésta puede alterar los niveles de los barbitúricos; puede estar indicado el control de los niveles en sangre.

### Lidocaína.

Posología. 4,4mg/kg,IM o IV, después de la sedación.

Contraindicaciones. Hipersensibilidad.  
Insuficiencia cardíaca.  
Aneurisma arterial.

Efectos secundarios. Depresión respiratoria.  
Vomitos.  
Recuperación prolongada.  
Disnea.  
Opistótonos.

Sinergias. Acepromacina, lidocaína. Potencializa el efecto.

### Ketamina.