

11

¿Que es?
el Protocolo

Las indicaciones para la Anestesia
En cerdos son muy limitadas

Se utiliza (esateca), vas
Transplante de

Protocolo
Anestésico
En cerdos

Farmacos utilizados
Para Anestesia General

Halotano

Anestésico Inhalatorio

00

Pentobarbital

Anestésico intravenoso de
Corta Acción, Duración 2hs.

Zoletil

Anestésico General con
Alto Margen de seguridad

Farmacos utilizados
Para Anestesia Local

Procaina

Anestésico local

Dosis

Lidocaina

Anestésico local

Dosis

Amelocaina

Anestésico local

Farmacos sedantes

Xanax

Tranquilizante en Porcinos o
Agente Respiratorio.

Dosis Trianol
sedativo

Primidona

Utilizado para prevenir el
Cambalacho en Primerizas

Dosis una to
750

Antibióticos
Utilizados

Amoxicilina

Antibiótico Beta lactámico

Dosis 8mg/kg

Ampicilina

Antibiótico Beta lactámico

Dosis 5mg/kg

Levofloxacina

Antibiótico Beta lactámico

Dosis 2.5-5mg/kg

Enrofloxacin

Antibiótico Quinolona

Dosis 7-10 mg/kg

Oritavonina

Antibiótico Tetraciclinico

Dosis 20,000

Penicilina

Antibiótico Beta lactámico

Dosis

14

Protocolo Anestésico en Cebras

¿Que es? **vi** **Protono**

Las indicaciones para un Anestesia: **Se** **otina** **en** **en**
En cebras son muy limitadas

(Eutanasia, Dorsicromia) y Transfunde de Embargo

Conflicto la monona de Tiamprinos
Quilidos Fiebre Recogitar con
Tiamprinos y anestésicos locales

Formas distintas para anestesia general

Halotano

Anestésico Inhalatorio

Dosis

Propofol

Anestésico intravenoso de corta acción, Dosis en Lvs.

Dosis 76 mg/kg IPV.

Zoletil

Anestésico general con alto margen de seguridad

Dosis 0.4-0.7 ml/kg IM
0.1-0.2 ml/kg IV.

Propioma

Anestésico local

Dosis

Ilforoma

Anestésico local

Dosis

Amorcania

Anestésico local

Formas secundas

Ala Tena

Tonacuillante en potasio o agente preservative.

Dosis

Tonacuillante 1Lvs/kg Reanestésico 2.4 mg/kg IM
Sedación 1mg/kg IM
VMO dilución 5-10 mg/kg IM

Piridona

Utilizado para prevenir el calambos en Parnalia

Dosis

una habie kg | 12 kg de peso
250 mg

Anestésicos utilizados

Amoxilina

Antibiótico beta lactámico

Dosis 8mg/kg IM
Antibiótico beta lactámico **Dosis** 5mg/kg IM.

Levoflo

Antibiótico quinolona

Dosis 2.5-5mg/kg SC o IM

Clorbutol

Antibiótico tetraciclina

Dosis 2-10 mg/kg IM.

Pamolina

Antibiótico beta lactámico

Dosis 20,000 - 84,000 UI/kg SC-IM.

Indicaciones para la Anestesia:
eidos son muy limitada)

Se utiliza en

(cesárea), Vasectomía y Transplante de Embrione

complemento

la mayoría de Tratamientos Quirúrgicos pueden realizarse con tranquilizantes y anestésicos locales)

uso normal

Halotano Anestésico Inhalatorio

Dosis

Propofol Anestésico intravenoso de corta acción, Duración 2hrs.

Dosis 2-6 mg/kg IV.

Zoletil Anestésico general con alto margen de seguridad

Dosis 0.4 - 0.7 ml / 10kg IM.
0.1 - 0.2 ml / 10kg IV.

uso normal

Procaina Anestésico local

Dosis

Lidocaina Anestésico local

Dosis

Amelocaina Anestésico local

Alazepam Tranquilizante en Porcinos o Agente Preoperatorio.

Dosis

Tiananzante 2mg/kg Preanestésico 2-4 mg/kg IM
sedación 1mg/kg IM
inmovilización 5-10 mg/kg IM

Primidona Únicamente para prevenir el temblor en Primeriza

Dosis

una tableta / 12 kg de peso
250 mg

Oxicina Antibiótico Betalactámico - Dosis 8 mg/kg IM

Flucloxacilina Antibiótico Betalactámico - Dosis 5 mg/kg IM.

Rifampicina Antibiótico Betalactámico

Enoxacilina Antibiótico Quinolona Dosis 2.5 - 5 mg/kg SC o IM

Clotrimazol Antibiótico Tetracloruro Dosis 2-10 mg/kg IM.

Meclofenoxil Antibiótico Betalactámico Dosis 20,000 - 84,000 UI/kg SC. IM.