

Nombre del alumno: Luis Angel Marañez
Gomez

Nombre del profesor: Sandra Moreno Lopez

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Materia: Patología | Celidos

Nombre del trabajo: Mapa Unidad 3.

Enfermedades de
reporte sanitario
de cerdos

PPA

Peste Porcina Africana

Enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y silvestres caracterizada por provocar coloración púrpura o amoratada en la piel de cerdos afectados

FPC.

Fiebre Porcina clásica.

Enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y salvajes. Al igual que la PPA. Provoca manchas amoratadas en la piel de los cerdos.

**INFLUENZA
Porcina**
gripe Porcina

Enfermedad respiratoria en los cerdos. Muy contagiosa, provoca con frecuencia brotes. Se han presentado casos de infecciones a humanos, que están en contacto directo.

**Exantema
Vesicular**

Enfermedad clínicamente indistinguible de la fiebre aftosa y por lo tanto de gran importancia esta afecta únicamente a los cerdos.

**ENCEFALOMIELIS
POR TESCHOVIRUS**

Conocida también como enfermedad de Teschen, es una patología aguda de los cerdos que se caracteriza por trastornos del sistema nervioso central.

Medida Virus altamente contagiosa
Afecta a cerdos domésticos y silvestres
transmitida por Pseudoscorpion Aritima
transmitida en la piel de cerdos afectados

Es causada por un virus del género
ASFVirus - de la familia ASFviridae

El virus se encuentra en secreciones
y excreciones (fluido nasal, oronasal,
semen, orina, heces)

Los signos clínicos en forma
Aguda son: fiebre, vómito
Resaca nasal, dificultad
para respirar, diarrea aguda
constricción pupilar o anisocoria
Otitis, Abdomen y muerlo.

Virus altamente contagiosa que
afecta a cerdos domésticos y silvestres. Al igual
A. Provoca manchas amarillentas
de los cerdos.

Es causada por un virus del género
Pestivirus de la familia Flaviviridae

El virus se encuentra en secreciones
y excreciones: saliva, fluido nasal,
semen, orina y heces

Los signos clínicos
son: fiebre, falta de
apetito, vómito, diarrea
convulsivos, diarrea.

Desde el
México
de esta

Respiratoria en los cerdos. Muy
Provoca con frecuencia brotes.
En los casos de infecciones a
veces en contacto directo.

Es causada por la influenza tipo A

El virus se encuentra en
secreciones y se transmite
por contacto directo.

Los signos clínicos
son: fiebre, letargo
falta de apetito, tos

El son
peyman
de de
posible
riesgo
para

clínicamente indistinguible
aftosa y por lo tanto de
ancin esta afecta únicamente

Los signos clínicos son:
Salivación, inapetencia mortalidad
en lechones lactantes, vesículas
alrededor de boca, nariz, lecheros etc

Altoamente contagioso por
contacto directo o por
contaminación ambiental

también como enfermedad
es una patología aguda
que se caracteriza
por el sistema nervioso




Es causada por Picornavirus

Se infectan por cavidad
oral y nasal, el tiempo
de incubación son 14
días.


Los signos clínicos
son: fiebre, anorexia
Trastornos locomotores
Injerencia de la leche, Temblores
Estímulo clínicos en patas
Parálisis flaccida.

BIBLIO

- www.90
- www.sen
- www.sen
- www.comur
- www.veterinaria
- El sitio



Altamente contagioso por contacto directo o por contaminación ambiental



Bibliografía

- www.gob.mx / Fiebre Porcina Clásica
- www.senasica / Peste Porcina Africana
- www.senasica / Influenza Porcina
- www.comunidadporcina.com / Examen Veterinario
- El sitio Porcino | Enfermedades