



Nombre del alumno: Manuela de los Angeles Deara Guzman

Nombre del profesor: MVZ. Carlos Alberto Trujillo Diaz

Licenciatura: Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Materia: Patologias y técnicas quirúrgicos en ovinos y caprinos

Nombre del trabajo: Super nota

Ocosingo, Chiapas a 11 de marzo de 2023

SUPER NOTA

Anaplasmosis

Descripcion

es causada por la bacteria intra-eritrocítica obligada *Anaplasma ovis*



Etiologia

Anaplasma ovis, la *Babesia ovis* y el *Trypanosoma vivax*


Signos clinicos

depresión, debilidad, pérdida de peso, ictericia, fiebre y anemia progresiva, disminución en la producción de leche y muerte²³



Diagnostico

PCR, serologia y prueba de sangre



Tratamiento

Tetraciclina y Oxitetraciclina



SUPER NOTA

Coccidiosis


Descripcion

Es una enfermedad parasitaria causada por protozoos del género Eimeria



Etiologia

Los corderos se infectan al ingerir los ooquistes de los pastos o ambiente contaminado por heces de otros animales afectados



Signos clinicos

deshidratación, palidez de la conjuntiva, apatía, dolor abdominal, tenesmo y pérdida de peso, diarrea



Diagnostico

PCR, serologia y prueba de heces



Tratamiento

Diclazirilo toltrazuliro, sulfamidas



SUPER NOTA

Distomatosis hepatica

Descripcion

La enfermedad puede presentarse en forma aguda, con muerte rápida del sujeto, aunque no es lo frecuente



Etiologia

Fasciola hepática, nombre con el que la ciencia distingue a un verme chato, no segmentado, perteneciente a la clase de los trematodes y que se localiza en los canales biliares de los bovinos y ovinos

Signos clinicos

disminución de la vivacidad y del apetito, enflaquecimiento. anemia, edema entre las mandíbulas y diarrea



Diagnostico

PCR, serologia y prueba de heces



Tratamiento

triclabendazol




SUPER NOTA

Pediculosis

Descripcion

La phthiriasis, pediculosis o piojera ovina



Etiologia

es producida por la presencia y multiplicación de insectos del orden Phthiraptera sobre la piel de los animales

Signos clinicos

Debido a la irritación y a la picazón que causan los piojos, los ovinos se muerden y se rascan, pudiendo dañar la lana



Diagnostico

Frotis , microscopio



Tratamiento

Invetroid, ivermectina



SUPER NOTA

Falsa garrapata ovina


Descripcion

Es una mosca, pero sin alas: este pequeño parásito produce la melofagosis ovina



Etiologia

melófago (*Melophagus ovinus*) que se lo llama comúnmente "falsa garrapata" o "garrapata de los lanares" por su apariencia similar



Signos clinicos

Las picaduras provocan irritaciones con lesiones visibles que desvalorizan el cuero, perdida de peso, retraso en el crecimiento



Diagnostico

puede identificarse fácilmente al igual que las pupas, de 3-4 mm de largo y color rojizo



Tratamiento

Invetroid, ivermectina



SUPER NOTA

Sarna

Descripcion

es una enfermedad contagiosa altamente prurítica causada por el ácaro *Psoroptes ovis*. Las ovejas afectadas desarrollan lesiones grandes cubiertas por una costra amarillenta y escamosa, acompañadas de daño en la lana y el cuero



Etiologia

La sarna ovina es causada por el *Psoroptes ovis*, un ácaro (artrópodo) de la familia *Psoroptidae* (orden *Astigmata*). Los ácaros *Psoroptes* tradicionalmente se han clasificado en especies según el huésped y las preferencias por el sitio del cuerpo, y la morfología de los ácaros machos

Signos clinicos

prurito, que es muy intenso; los ovinos están inquietos, se frotan y muerden las áreas afectadas. La piel está húmeda y caliente con eritema intenso, pápulas y vesículas



Diagnostico

La más común es el raspado de la piel, con la detección de los ácaros al microscopio o mediante la digestión con hidróxido de potasio (KOH)



Tratamiento

ivermectina, doramectina o moxidectina, ascaricidas




SUPER NOTA

Oestrus ovis

Descripcion

El gusano o mosca de la nariz ocasiona una enfermedad parasitaria llamada Oestrosis ovina o Miasis de la nariz



Etiologia

especie de díptero de la familia Oestridae, cuyas larvas causan la miasis conocida con el nombre de oestrosis ovina, enfermedad también llamada rinitis-sinusutis parasitaria


Signos clinicos

descarga nasal seromucosa o purulenta, estornudos frecuentes, incoordinación y disnea



Diagnostico

directo de la oestrosis se realiza mediante la observación de las formas larvianas del parásito, ya sea por el hallazgo de larvas en sus ubicaciones naturales durante la necropsia del hospedador



Tratamiento

Rafoxanide en dosis de 7.5 mg/kg administrado por vía oral. Closantel a 7.5 mg/kg. Nitroxinilo de 15-20 mg/kg. Ivermectina a razón de 0.2 mg/kg

