



**Nombre del alumno: Ángel Gabriel
Gómez
Guillen**

Nombre del profesor: carlos trujillo

**Licenciatura: Medicina Veterinaria
y Zootécnica**

Materia: IVINOS Y CAPRINOS



2

Ectima
contagiosa

Etiología { El ectima contagioso se debe a una infección por el virus or, un miembro del género Parapoxvirus en la familia Poxviridae

Transmisión { El virus en lesiones cutáneas y costras se piensa que ingresa en la piel a través de cortes y abrasiones

Desinfección { Los mejores desinfectantes para los Poxvirus son detergentes.

Especies afectadas { se ocurre en ovejas, cabras, alpacas, camello yeno, buves.

Tratamiento [NO hay

Prevención { higiene, vacunación, desparasitantes
restritar plantas

Morbilidad y mortalidad { suele ser alto, con frecuencia de 80% en el rebaño sin vacunar
Es contagioso por lesiones de la ubre.

1

Colibacilosis en corderos

- Como se produce { Es una infección producida por *Escherichia coli* en bovinos y en escasa información de este tipo de infección se da en la especie ovina.
- Su etiología { Es un bacilo gram negativo, aerobio, no esporulado el cual se presenta solo o en cadenas y mide 0.5 a 3.0 μm y se puede ejercer con efecto adverso en la salud. Su clasificación de *E. coli* esta basada en las propiedades fermentativas de la bacteria y en la demostración serológicas.
- Epidemiología { La colibacilosis tiene un aumento de la prevalencia que es considerable como importancia para la industria ovina y que se encuentran distribuidos en corderos.
- Morbilidad y mortalidad { se reportaron mortalidades en corderos y se observan los brotes de colisepticemia en corderos de una cifra de 1 a un 20% de pérdidas debido a una infección por *E. coli*.
- Fuentes de infección { se pueden contagiar por contacto directo o el ambiente (piso, cama, agua, alimentación)
- Patogénesis { Existen dos tipos de infección (sistémica y entérica)