

# Unidad 4

## 4.1. Cuidados de Enfermería al paciente con quimioterapia

Los cuidados de enfermería que estos pacientes precisan, van siempre relacionados con los efectos secundarios originados por el tratamiento.

- CUIDADOS DE ENFERMERIA:** Algunos citostaticos pueden causar estreñimiento, causando un trastorno de la motilidad intestinal.
- CUIDADOS DE ENFERMERIA:** Se considera diarrea como consecuencia del tratamiento con citostaticos cuando hay 3 o más evacuaciones liquidas en las 24 horas siguientes
- Mucositis:** Se deberá informar al paciente sobre los distintos efectos de la quimioterapia sobre el tracto gastrointestinal y la boca. Aparece a los 7-14 días de la administración de citostaticos y puede permanecer durante 2-3 semanas.
- SISTEMA EPITELIAL c:** Cuidados de Enfermería. Se trata de un efecto frecuente que varía en función del tipo de tratamiento quimioterápico utilizado. O
- E- SISTEMA URINARIO:** Cuidados en enfermería

## 4.2. Cuidados de Enfermería al paciente con dolor

La multidimensionalidad del dolor implica la necesidad de una intervención interdisciplinar

El enfermero/a suele ser el profesional más cercano al paciente, tanto cuando se encuentra ingresado como cuando está en su medio domiciliario.

la intervención de enfermería en el dolor implica:

- La localización
- La intensidad
- La cualidad
- El inicio y duración del episodio doloroso.
- Valorar factores que aumentan y disminuyen la tolerancia al dolor
- Establecer con el paciente y su familia los objetivos de control del dolor
- Proporcionar a la persona un alivio óptimo
- Rápida intervención cuando el paciente demande un analgésico.
- Registrar la aparición y monitorizar los efectos secundarios de los fármacos

## ASPECTOS GENERALES DEL USO DE ANALGÉSICOS:

Nunca se debe usar placebos pues, además de representar un comportamiento éticamente discutible

La potencia del analgésico a utilizar la determinará la intensidad del dolor no el diagnóstico ni el pronóstico de la enfermedad.

La percepción del dolor ejerce un efecto de "recuerdo permanente" de la enfermedad. Reducir esa percepción disminuye la cascada de anticipación

## 4.3. El enfermo en estado de shock

Es un estado fisiopatológico que reúne una cantidad de síntomas y signos, los cuales manifiestan una inadecuada perfusión tisular.c

Todos los tipos de shock pueden producir alteración de la perfusión tisular y desarrollar insuficiencia circulatoria aguda o

### Clasificación

Hipovolémico.

## 4.4. El departamento quirúrgico

es aquella sala o habitación que se halla en sanatorios, hospitales o centros de atención médica

Respecto de las exigencias y las condiciones que debe sí o sí observar un quirófano para cumplir satisfactoriamente con su misión se cuentan: 1

exigencias y las condiciones que debe sí o sí observar un quirófano

debe tratarse de un espacio cerrado  
la limpieza y la aspiración de lograr un grado cero de contaminación es otra condición