



**Mi Universidad**

## **Mapa conceptual**

**NOMBRE DEL ALUMNO:** Seliflor Morales Pérez.

**TEMA:** Cesárea.

**PARCIAL:** 1er parcial.

**MATERIA:** Ginecología y obstetricia.

**NOMBRE DEL PROFESOR:** Lic. Ervin Silvestre Castillo.

**LICENCIATURA:** Lic. En Enfermería

**CUATRIMESTRE:** 5to cuatrimestre.

# Cesárea

## Definición

Procedimiento quirúrgico mediante el cual el feto y los anexos ovulares son extraídos a través de una incisión en el abdomen

## Tipos de cesárea

### Según antecedentes obstétricos

#### Primera

Es la que se realiza por primera vez.

En todas las pacientes embarazadas es importante hacer la prueba de trabajo de parto.

Con la finalidad de

Evitar realizar una cesárea.

#### Repetida o previa

Es cuando existe el antecedente de una cesárea anterior.

Se tratará hasta donde sea posible el parto vaginal

Con el propósito de

Evitar los posibles riesgos a la operación cesárea.

Contraindicaciones para permitir el parto vaginal en cesárea previa

- . Antecedentes de 2 o más cesáreas o recientes menor a 12 meses

- . Antecedentes de cesárea previa tipo segmento-corporal.

- . Antecedentes de ruptura uterina.

#### Iterativa

Es la que se practica en un paciente con antecedentes de 2 o más cesáreas.

Los riesgos que puede presentar son

- . Problemas con la placenta se implante se implante muy profundamente en la pared uterina.

- Complicaciones relacionadas con la incisión puede ser por una hernia, aumenta a medida que aumentan las incisiones.

### Según grado de urgencia.

#### Urgente

Es la que se practica para prevenir o resolver una complicación materna o fetal en etapa crítica.

Es necesario cierta agilidad sin que genere estrés o pérdida de control.

#### Electiva

También conocida como programada

Sus beneficios en personas con VIH son

prevenir la transmisión de madre a hijo.

#### Por petición.

Es solicitada por la madre en ausencia de alguna indicación, esta no puede ser realizada antes de las 39 semanas de gestación.

### Según grado de histerotomía

#### Corporal o clásica.

La incisión se realiza en el cuerpo uterino.

Sus indicaciones más frecuentes son

Feto en situación transversa con dorso inferior, embarazo pretérmino, embarazo múltiple, histerorrafia corporal previa placenta previa en cara anterior.

#### Segmento corporal.

Es la incisión que se realiza sobre el segmento y cuerpo uterino

Sus principales indicaciones son

Embarazo pretérmino, embarazo gemelar, situación fetal transversa con dorso inferior, placenta previa a la cara anterior del útero.

#### Segmento arciforme o transversal (tipo Kerr).

La incisión transversal del segmento inferior tiene la ventaja de producir menos hemorragia.

Permite una fácil apertura y cierre de la pared uterina, cicatriz uterina muy resistente

#### Transversa por avulsión (Misgav Ladach o Strark)

Disminuye el tiempo de la intervención, la pérdida de sangre, la fiebre y el dolor posoperatorio y la estancia en el intrahospitalaria.

