



Mi Universidad

MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: Jessica Hernández Pérez

TEMA: Padecimientos infecto-Contagiosos en los niños

PARCIAL: I

MATERIA: Patología del niño y el Adolescente

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Clotosinda Escobar

LICENCIATURA: Enfermería

PADECIMIENTOS
INFECTO-CONTAGIOSOS
EN LOS NIÑOS

Tos ferina

Es

Bordetella pertussis. El género Bordetella incluye, además de B. pertussis, otras especies de las que al menos B. parapertussis es reconocida como patógeno respiratorio en humanos y responsable de un cuadro clínico indistinguible del de la tos ferina clásica por B. pertussis.

Síntomas

Fase 1:

Fase 2:

Pueden durar de 1 a 2 semanas y suelen incluir:
-Moqueo o congestión nasal.
-Fiebre baja (menos de 100.4 °F).
-Tos leve ocasional (puede no suceder con los bebés).
-Apnea (pausas en la respiración que pueden ser mortales) y ponerse azul o morado en el caso de bebés y niños.

Accesos de tos generalmente duran entre 1 y 6 semanas, pero pueden durar hasta 10 semanas.
-Emitan un sonido agudo causado por una inspiración intensa y ruidosa cuando finalmente pueden inhalar al final de un acceso
-Vomiten durante o después de los accesos
-Se sientan muy cansados después del acceso, pero parezcan estar bien entre estos.

Difteria

Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que puede afectar a las vías respiratorias, a la piel o puede no producir ningún síntoma (en este caso se trata de portadores sanos de la enfermedad).

Diagnóstico: se basa en la sintomatología y requiere el cultivo de la bacteria en muestras tomadas de la faringe o de la nariz por medio de un bastoncillo de algodón.

Tratamiento: Los pacientes con difteria respiratoria deben ser hospitalizados para controlar la respuesta al tratamiento y vigilar las posibles complicaciones.

Tétanos

Es

Una enfermedad aguda y grave inducida por una exotoxina del bacilo tetánico, el Clostridium tetano, que crece en condiciones de anaerobiosis en las heridas.

Síntomas

(Promedio, entre 5 y 10 días). Los síntomas del tétanos incluyen:
-Rigidez mandibular (más frecuente)
-Dificultades para deglutir
-Inquietud
-Irritabilidad
-Rigidez del cuello, los brazos o las piernas
-Arqueamiento de la espalda (opistótonos)
-Cefalea

Poliomielitis

Es una enfermedad caracterizada por una parálisis flácida asimétrica causada por los tres serotipos del virus de la poliomielitis.

Escarlatina

Es causada por bacteria Un grupo de bacterias llamado *Streptococcus* del grupo A (estreptococos del grupo A) causa la escarlatina. Estas bacterias a veces producen un veneno (una toxina

La mayor parte (70 a 75%) de las infecciones no produce síntomas. La sintomática se clasifica como:
-Poliomielitis abortiva
-Poliomielitis parálitica.

Tratamiento

-Tratamiento de sostén. La terapia convencional de la poliomielitis se basa en medidas de apoyo, como reposo, analgésicos y antipiréticos a demanda.

Sarampión

Es una infección viral muy contagiosa que aparece con mayor frecuencia en niños. Se manifiesta con fiebre, tos, rinitis, conjuntivitis, un enantema (manchas de Koolik) en la mucosa oral.

Diagnostico

-Evaluación clínica
-Pruebas serológicas
-Detección viral por cultivo o reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR).
El sarampión típico puede sospecharse en un paciente expuesto que presenta rinitis, conjuntivitis, fotofobia y tos.

Síntomas

-Dolor de garganta con enrojecimiento intenso.
-Fiebre (de 101 °F o más).
-Recubrimiento blancuzco en la lengua al principio de la enfermedad.
-Lengua "aframbuesada" (roja y con pequeños bultos).
-Sarpullido rojo que al tacto parece papel de lija.

