UDS
PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del alumno: Edgar Yael de la Cruz Gomez

Nombre del profesor: MVZ. Polidoro Montesino Moguel

Licenciatura: Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Materia: Introduccion a la cirugía patologia y técnicas quirúrgicas de

PARASITOSIS EN EQUINOS🐎.

CESTODOSIS.

- Forma de contagio.
  - Por huevecillos.
    - A causa de otro animal enfermo
  - Entra via oral.
- Zona de alojamiento.
  - Intestino y se adhiere a ello.
- Patología.
  - colicos.
  - falta de apetito.
- Implicaciones.
  - Roptura de la pared intestinal.
  - Genera dolor.
- Tratamiento.
  - Uso del prasicuantel.

ASCARIS.

- Forma de contagio.
  - Lombrices.🪱
    - Coloca huevecillos.
      - Agua con huevecillos.
      - Alimentos contaminados.
- Zona de alojamiento.
  - Intestinos para su incubación.
  - Adultas llegan al flujo sanguíneo.
    - LLEGANDO:
      -HIGADO.
      -CORAZON.
      -PULMONES.
      - En pulmones salen. (por tos).
        - Entran por 2da ves y genera problemas.
- Patología.
  - Obstrucción en los intestinos.
    - Muerte en algunas zonas del intestino.
  - Migra a pulmones.
    - Problemas como la neumonía.
- Implicaciones.
  - Muerte del animal.
  - Mala alimentación.
  - Decaídes del animal.
- Tratamiento.
  - Uso de antiparasitarios.
  - Cirugía.

ESTRONGILOIDES

- Forma de contagio.
  - Ingiriendo pasto.
    - Se encuentra en el pasto
      - Por animales contagiados.
  - Entrando tracto digestivo.
- Zonas de alojamiento.
  - Intestinos.
  - Migran a vasos sanguíneos🩸.
    - Migrando a otros órganos.
- Patología.
  - Diarrea
  - Dolor abdominal.
  - Eusinofilia.
- Implicaciones.
  - Mala absorción de nutrientes.
  - Problemas infecciosos.
- Tratamiento.
  - Antiparasitario.
    - Ivermectina.
    - Albendazol.

TENIAS.

- Forma de contagió.
  - Ingesta de alimentos.
    - En pastos con huevecillos.
    - Agua contaminado.
- Zona de alojamiento.
  - En el intestino.
  - Pegándose al intestino.
- Patología.
  - Cólicos.
  - Dolor.
- Implicaciones.
  - Dolor e incomodidad
  - Falta de apetito.
  - Provoca cólicos.
- Tratamiento
  - Antiparasitario.

REZNOS.

- Forma de contagio.
  - Ingiere los huevecillos.
  - Mediante la mosca🪰.
    - Coloca huevecillos
- Zona de alojamiento.
  - Intestino.
    - pegándose en las paredes.
- patologia
  - Retraso del crecimiento.
  - Falta de apetito.
  - Adelgazamiento.
- Implicaciones.
  - Problemas en su desarro
  - Problemas de más enfermedades.
  - Anemia.
- Tratamiento.
  - uso de antiparasitarios.

OXIUROS

- Forma de contagio.
  - Ingesta de alimentos.
  - Ingesta de agua contaminado.
  - Causado por animal parasitado.
- Zona de alojamiento.
  - Intestino grueso.
    - Migra al ano.
- Patologías.
  - Perdida de apetito.
  - Plurito en el periné.
- Implicaciones.
  - Perdida de peso.
  - Molestia.
  - Anomalias en el animal
- Tratamiento.
  - Utilizar probencimidazoles:
    febantel.
    bencimidazoles:
    fenbendazol, mebendazol, tiabendazol.

BIBLIOGRAFÍA
1.https://es.virbac.com/enfermedades/parasitos-internos-equinos
2.https://www.hospitalveterinariglories.com/enfermedades-comunes-caballos/

xMind Evaluation Copy