



**Nombre del alumno: Oscar Omel  
Lopez Osorio**

**Nombre del profesor: Guillermo  
Montesinos Moguel**

**Licenciatura: Medicina Veterinaria y  
Zootecnia**

PASIÓN POR EDUCAR


**Materia: Patologías y técnicas quirúrgicas en  
pequeñas especies**

**Cuatrimestre: 4to**

**Nombre del trabajo: Abordaje farmacológico  
de los principales problemas respiratorios**

Chiapas a 15 de diciembre del 2023

# Principals activos empleados para el tratamiento de las signologias respiratorias



| PENICILINA          | VIA ADMINISTRACION                          | ESPECIE            | DOSES MEDIA (mg/min)  | TIEMPO HORARIO    |
|---------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|
| PENICILINA G MODICA | intramuscular (Excepcionalmente via venosa) | Equinos y Bovinas  | 10.000 a 20.000 U     | cada 12 horas     |
| PENICILINA G MODICA |   | Caballos           | 5.000 U               | cada 12 horas     |
| PENICILINA G MODICA |   | Caballos y felinos | 5.000 U               | cada 12 o 6 horas |
| PENICILINA G MODICA |   | Equinos y felinos  | 20.000 U              | cada 12 o 6 horas |
| PENICILINA G MODICA | intramuscular                               | Todos los especies | 5.000 a 12.000 U      | 12-14-16-18 horas |
| PENICILINA G MODICA | intramuscular                               | Todos los          | 10.000 a 20.000 U     | 12 hasta 96 horas |
| PENICILINA G MODICA | intramuscular                               | Equinos y felinos  | 10 mg                 | 12-18 horas       |
| PENICILINA G MODICA | intramuscular                               | Caballos y felinos | 15 mg                 | 12 a 24 horas     |
| PENICILINA G MODICA | oral (intramuscular (excepto Streptococci)) | Equinos            | 5-20 mg               | 12-18-12 horas    |
| PENICILINA G MODICA | oral (intramuscular (excepto Streptococci)) | Equinos            | 2-7 mg                | 12-12-24 horas    |
| CLINDACILINA        | oral  | Equinos            | 5-20 mg               | 6 horas           |
| CLINDACILINA        | intramuscular                               | Equinos            | 10-15 mg              | 12-18 horas       |
| CLINDACILINA        | intramuscular                               | Equinos            | 5-20 mg               | 12-18 horas       |
| CLINDACILINA        | intramuscular                               | Equinos            | 200-400 mg por cuarto | 12-18 a mas horas |

dosis

## Bibliografía

- "Monografías Medicina Veterinaria." *web.uchile.cl*, [https://web.uchile.cl/vignette/monografiasveterinaria/monografiasveterinaria.uchile.cl/CDA/mon\\_vet\\_simple/0,1420,SCID%253D7892%2526SID%253D355%2526PRT%253D7869,00.html](https://web.uchile.cl/vignette/monografiasveterinaria/monografiasveterinaria.uchile.cl/CDA/mon_vet_simple/0,1420,SCID%253D7892%2526SID%253D355%2526PRT%253D7869,00.html). Accessed 18 Feb. 2023.
- Marino, V. (2021). Estudios sobre la infección por *Thelazia callipaeda* en el perro y el gato y su vector *Phortica variegata* en España.
- Risso, A. L. (2016). Conceptos Básicos de Nutrición en perros y gatos.
- CIMAVET.ES