



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Citlali Anayanci Palacios Coutiño

Dr. Alfredo López López

FISIOPATOLOGIA

Resumen salud pública y epidemiología

2da unidad

2do semestre

Licenciatura en medicina humana

MAPA CONCEPTUAL FIENRE Y DOLOR



¿QUE ES DOLOR?

SINTOMA FRECUENTE QUE VARIA AMPLIAMENTE EN INTENSIDAD , EL DOLOR ES EL SINTOMA MAS FRECUENTE POR EL CUAL LA GENTE BUSCA ATENCION MEDICA.

DOLOR AGUDO

LA VIA PARA EL DOLOR AGUDO DISCRIMINADO CON RAPIDEZ SE MUEVE DIRECTAMENTE DESDE EL RECEPTOR HACIA LA MÉDULA ESPINAL POR MEDIO DE FIBRAS AS MIELINICAS Y DESDE LA MEDULA ESPINAL HASTA EL TALAMO

DOLOR LENTO

LA VIA DEL DOLOR LENTO SE TRANSMITE A LA MEDULA ESPINAL HASTA EL TALAMO POR MEDIO DEL FIBRAS C AMIELINICAS Y DESDE LA MEDULA ESPINAL HASTA EL TALAMO POR MEDIO DEL TRACTO PALOESPINOTALAMICO.

TIPOS DE DOLOR

EL DOLOR SE CLASIFICA DE LA SIGUENTE MANERA: AGUDO (DURA MENOS DE 6 MESES)O CRONICO (DURA MAS DE 6 MESES) , CUTANEO O PROFUNDO Y VISCERAL

FIEBRE

Y

DOLOR

DEFINICION DE FIEBRE

LA FIEBRE O PIREXIA DESCRIBE LA ELEVACION DE LA TEMPERATURA CORPORAL QUE SE DEBDE AL DESPLAZAMIENTO DEL PUNTO DE REFERENCIA TERMICO DEL CENTRO TERMORREGULADOR DEL HIPOTALAMO HACIA VALORES SUPERIORES.

CAUSA DE LA FIEBRE

LOS PIROGENOS SON SUSTANCIAS EXOGENAS O ENDOGENAS QUE CAUSAN FIEBRE; LOS PIROGENOS EXOGENOS PROVIENEN DEL EXTERIOR DEL ORGANISMO INCLUYEN SUSTANCIAS COMO PRODUCTOS BACTERIANAS

COMPORTAMIENTOS FISIOLÓGICOS

- FASE PRODRÓMICA
- FASE DE ESCALOFRIOS
- FASE DE RUBICUNDEZ
- FASE DE DEFERESCENCIA

FIEBRE INTERMITENTE Y REMINENTE

LA FIEBRE INTERMITENTE ES AQUELLA EN LA QUE LA TEMPERATURA RSE RECUPERA POR LO MENOS 24HRS. LA FIEBRE REMINENTE ESTÁ NO REGRESA A LA NORMALIDAD Y VARIA UNOS CUANTOS GRADOS EN CUALQUIER DIRECCIÓN.

BIBLIOGRAFIA

Tommie L. Norris, (2019) porth fisiopatología
México, Wolters kluwer UNIDAD 5,CAPITULO 14 PAGS.396/ 421