

Universidad del Sureste.

Campus Tuxtla Gutiérrez.

Iris Rubí Vázquez Ramírez.

Lic. En medicina humana.

Sexto semestre.

Actividad 2: mapa conceptual.

Técnicas quirúrgicas.

Dr. Alfredo López López

Sábado 29 de abril del 2023.

ACCESOS VASCULARES
UTILIZADOS EN HEMODIALISIS.

FISTULA AV.

CATETER

INJERTO O GRAF.

EL ACCESO PREFERIDO
YA QUE PRESENTA
MENOS
COMPLICACIONES Y

ES LA CONEXION QX
ENTRE UNA ARTERIA Y
UNA VENA LO QUE
PERMITE EL
DESARROLLO DE LA
VENA Y EL
ENGROSAMIENTO DE
SUS PAREDES CON EL
OBJETO DE QUE LA
VENA PUEDA SER
PUNCIONADA CON
FACILIDAD
PERMITIENDO EL FLUJO
DE SANGRE ADECUADO

LA FAV NO PUEDE SER
USADA DE INMEDIATO
PUES DEBE "MADURAR"
DE 4 A 5 SEMANAS.


CENTRAL

SE INTRODUCE EN
UNA VENA GRANDE YA
SEA DEL CUELLO,
TORAX O MUSLO Y
QUE SE FIJA A LA
PIEL. SON UTILIZADOS
POR UN CORTO
PERIODO DE TIEMPO
MIENTRAS SE
PREPARA UNO
DEFINITIVO.



TUNELIZADO

SE REQUIERE DE UN
TUNEL SUBCUTANEO
PARA SU INSTALACION
Y PUEDE SER
UTILIZADO POR UN
TIEMPO PROLONGADO



SE UTILIZA CUANDO LA
CALIDAD DE LAS VENAS
NO ES LA ADECUADA
COMO PARA REALIZAR
UNA FISTULA

SE UNE UNA ARTERIA Y
UNA VENA DEL BRAZO
POR MEDIO DE UN TUBO
DE MATERIAL SINTETICO
DEBAJO DE LA PIEL

UN ACCESO VASCULAR
CON PROTESIS PUEDE
ESTAR LISTO PARA
USARSE EN 3 A 6
SEMANAS.

