


SINDROME LATEX

FRUTA


DEFINICION



LAS PERSONAS ALÉRGICAS AL LÁTEX PRESENTAN A MENUDO REACCIONES ALÉRGICAS CRUZADAS, A VECES GRAVES, TRAS INGERIR DETERMINADAS FRUTAS Y VEGETALES. ASÍ, HASTA UN TERCIO DE LAS PERSONAS SENSIBILIZADAS AL LÁTEX SUFRIRÁN UNA REACCIÓN ALÉRGICA DE MAYOR O MENOR INTENSIDAD CUANDO COMAN PLÁTANO, KIVI, AGUACATE O CASTAÑA. ADEMÁS, ENTRE EL 5% Y EL 10% PUEDEN SUFRIR UNA REACCIÓN ALÉRGICA AL COMER FRUTAS DE LA FAMILIA DE LAS ROSÁCEAS (MELOCOTÓN, ALBARICOQUE, MANZANA, PERA O CEREZA) Y HORTALIZAS DE LA FAMILIA DEL TOMATE Y LA PATATA.

SINTOMAS

LEVES: ES MOTIVO DE SOSPECHA CUALQUIER PERSONA QUE PRESENTA PICOR, LAGRIMEO O ENROJECIMIENTO OCULAR, IRRITACIÓN NASAL, ENROJECIMIENTO Y HABONES EN LAS MANOS, TOS SECA.



GRAVES: DIFICULTAD RESPIRATORIA O SIBILANCIAS, ASMA, OPRESIÓN TORÁCICA O RUBOR, PALPITACIONES Y MAREO, HIPOTENSIÓN, CHOQUE ANAFILÁCTICO.

LA GRAVEDAD DE LA REACCIÓN INMEDIATA DEPENDE DEL GRADO DE SENSIBILIDAD DE LA PERSONA Y DE LA CANTIDAD DE ALÉRGENO DE LÁTEX QUE INGRESE EN SU CUERPO.

DIAGNOSTICO



CUALQUIER SOSPECHA DE ALERGIA DEBE CONFIRMARLA EL ALERGÓLOGO A PARTIR DE LA HISTORIA CLÍNICA REFERIDA, LAS PRUEBAS CUTÁNEAS (HABITUALMENTE PRICK TEST) Y LA DETERMINACIÓN DE IGE ESPECÍFICA AL LÁTEX EN SANGRE. EN ALGUNOS CASOS ES NECESARIA UNA PRUEBA DE EXPOSICIÓN CONTROLADA.

TRATAMIENTO

LAS REACCIONES ALÉRGICAS AL LÁTEX SE TRATAN COMO CUALQUIER OTRA REACCIÓN ALÉRGICA, CONTRARRESTANDO CON LA MEDICACIÓN ADECUADA LOS SÍNTOMAS DE LA REACCIÓN. MIENTRAS QUE LAS REACCIONES LEVES SUELEN REMITIR CON ANTIHISTAMÍNICOS, CORTICOIDES Y/O INHALADORES BRONCODILATADORES, EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN PARA LAS REACCIONES GRAVES ES LA ADRENALINA. ÉSTA DEBE SER ADMINISTRADA RÁPIDAMENTE TRAS EL INICIO DE LA REACCIÓN, POR LO QUE EXISTE ADRENALINA AUTOINYECTABLE PARA LOS PACIENTES CON RIESGO DE PRESENTAR REACCIONES GRAVES.

