



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESTUDIANTE: CARLOS
MANUEL LÁZARO VICENTE

CURSO: INMUNOALERGÍA


DOCTOR: SAÚL PERAZA
MARÍN

8vo SEMESTRE

ALERGIA AL LATÉX

¿Qué es?

La alergia al látex es una reacción a ciertas proteínas que se encuentran en el látex de caucho natural, un producto derivado del árbol de caucho



Síntomas leves

Algunos síntomas de alergia al látex son los siguientes:

Picazón

Enrojecimiento de la piel



Síntomas más graves

Algunos de ellos son los siguientes:
Estornudos
Goteo de la nariz
Ojos llorosos y con picazón
Garganta irritada

Síntomas potencialmente mortales:

Anafilaxia
La reacción alérgica más grave al látex es la anafilaxia, que puede ser mortal.
Dificultad para respirar
Urticaria o hinchazón
Náuseas y vómitos
Sibilancia



La alergia al látex puede ocurrir por estos motivos:

Contacto directo. La causa más frecuente de alergia al látex consiste en el contacto con productos que contienen látex



Inhalación

Los productos de látex, especialmente los guantes, liberan partículas de látex. Estas partículas se pueden inhalar cuando se transmiten por el aire.



¿Cómo se diagnostica?

Cualquier sospecha de alergia debe confirmarla el alergólogo a partir de la historia clínica referida, las pruebas cutáneas (habitualmente prick test) y la determinación de IgE específica al látex en sangre. En algunos casos es necesaria una prueba de exposición controlada.



TRATAMIENTO

Las reacciones alérgicas al látex se tratan como cualquier otra reacción alérgica, contrarrestando con la medicación adecuada los síntomas de la reacción. Mientras que las reacciones leves suelen remitir con antihistamínicos, corticoides y/o inhaladores broncodilatadores, el tratamiento de elección para las reacciones graves es la adrenalina.



La alergia a la fruta permanece para siempre?

¿Cómo se diagnostica la alergia alimentaria?

El diagnóstico de la alergia alimentaria comienza con:
1) Una exploración física
2) Un historial médico de antecedentes de alergias alimentarias



La respuesta depende de la edad a la que comenzaron los efectos de la alergia, su gravedad y el alimento implicado, entre otros factores. Normalmente, casi todas las alergias alimentarias "se curan" o resuelven con el tiempo, especialmente las que comienzan a edades muy tempranas y los alimentos implicados son la leche y el huevo.

Pruebas y control de la alergia alimentaria

Un análisis de sangre, junto con un historial médico relativo a la alergia, puede ayudar a identificar los desencadenantes de los alérgenos subyacentes.