





UDS
MI Universidad

ESQUEMA DE RABIA

NOMBRE DEL ALUMNO (A): LUPITA MELINE TOLEDO ALFARO
NOMBRE DEL CATEDRATICO (A): DRA MONICA GORDILLO RENDON
MATERIA: SALUD PUBLICA II.
MEDICINA HUMANA 2°





Roedores

Agresión o contacto con rata, raton,ardilla, hámster, cuyo, etc.

RESERVORIOS DOMESTICOS

Agresión o contacto que presentes signología compatible a rabia.

RESERVORIOS DOMESTICOS DE INTERES ECONOMICO

Manipulación de hocico y despojos sin protección en ganado bovino, porcino, caprino, ovino y equino, con signología compatible a rabia.

RESERVORIOS SILVESTRES

Agresion o contacto con murciélago, zorrillo, zorro, coyote, lince, puma, coati, etc.

El virus rábico no se transmite por estas especies, el paciente NO requiere profilaxis con BAH.

¿El animal es localizado en 72 horas?

¿El animal esta disponible para diagnostico?

NO

Exposición de riesgo grave

“SIN” antecedentes VAH

“CON” antecedentes de VAH

“Actividades de foco rábico”

“Exposición de riesgo del paciente”
Determinar la categoría de exposición e iniciar profilaxis antirrábica

Enviar encéfalo al laboratorio para diagnóstico de rabia

Esquema de 4 dosis VAH (días 0,3,7 y 14) mas igAH a 20 UI/kg intra perilesional, el sobrante aplicar IM

Esquema de 2 dosis VAH (días 0 y 3) la igAH No esta indicada

Vacunación vigente

Mantener en observación durante 10 días

¿Fallece durante la observación?

SI

¿el resultado es positivo?

SI

Exposición de riesgo leve

“Sin” antecedentes de VAH
Esquema de 4 dosis VAH (dosis 0,7,14)

“Con” antecedentes de VAH
Esquema de 2 dosis VAH (dosis 0,3) la igAH no esta indicada.

SIN RIESGO EL PACIENTE NO REQUIERE PROFILAXIS SUSPENDER LA PROFILAXIS EN CASO DE HABERLA INICIADO

“ALTA SANITARIA”

BIBLIOGRAFIA

- GOB.MX/SALUD/CENAPRECE.

